思鼻力鼻通液 0.5 公絲/公撮

Nostra Nasal Spray 0.5mg/ml

適用藥害救濟制度

思鼻力鼻通液含有 Oxymetazoline HCl 可迅速解除因感冒或過敏性鼻炎所引起的鼻塞、流鼻水、鼻竇炎、慢性鼻炎、過敏性鼻炎及由過敏所引起之鼻充血。

[成　　分]每 ml 中含有：

Oxymetazoline hydrochloride.....0.5mg

本產品每 ml 內含非活性成分：Potassium Phosphate Monobasic、Potassium Phosphate Dibasic、Disodium Edetate、Benzalkonium Chloride、Glycerin、l-Menthol、Purified Water。

[適 應 症]

暫時緩解因感冒過敏或鼻竇炎所引起之鼻充血。

[用法用量]

每次噴壓 2~3 下，噴入每一鼻孔，1 天 2 次。小孩大於 6 歲同大人。

[注意事項]

1. **一般性注意：連用或多次使用導致反應性降低及局部粘膜二次充血，僅限於急性充血時使用或適當停藥期間再使用。**
2. **禁忌：〈1〉對本藥有過敏症之患者。〈2〉未滿 2 歲之幼兒嬰兒。〈3〉MAO 抑制劑投藥中之患者，因會造成緊急高血壓現象。**
3. **慎重投與：衡量效益與危險〈1〉冠狀動脈患者〈血管收縮，使冠狀動脈患者增惡之虞〉。〈2〉心臟疾患包括心絞痛或高血壓〈末梢血管收縮、血壓有上升之虞〉。〈3〉甲狀腺機能亢進症患者〈因其交感神經呈多興奮狀態〉。〈4〉糖尿病患者〈肝臟之肝醣分解血糖上升作用〉。〈5〉對本藥或其他鼻充血劑過敏者。**
4. **孕婦使用：Oxymetazoline 可能全身吸收，但未確證在人体的影響，對孕婦之安全性未確立，故對孕婦或可能懷孕之婦女，應對療效與其危險性上加以判斷使用。**
5. **授乳：Oxymetazoline 可能全身吸收，但未確證在人体的影響。**
6. **小兒使用：Oxymetazoline 可能會有全身吸收引起不良反應。〈1〉過量使用易產生發汗、徐脈、昏睡等全身症狀出現，不使用為宜。〈2〉不得不使用時，應正確指導，並對其使用慎重觀察之。**
7. **老人使用：目前尚未有老人在年齡與 Oxymetazoline 作用相關性的研究，因此尚未有老人專一性問題的結論。**

[交互作用]

MAO 抑制劑，三環抗受鬱劑或 Maprotiline-Oxymetazoline 有明顯吸收時，併用時會加強 Oxymetazoline 的血壓作用。

[副 作 用]

〈1〉過敏症：出現過敏症時應中止。〈2〉精神神經系統：偶有神經過敏、頭痛、眩暈、失眠、頭痛腳輕等症狀出現。〈3〉循環器官：偶有心悸亢進等出現。〈4〉消化系統：偶有噁心嘔吐等出現。〈5〉鼻：偶有熱感、刺激痛、乾燥感、反彈性充血、流鼻水打噴嚏等出現。

[包　　裝]

100ml 以下塑膠瓶裝。

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第 043440 號
GMP 優良藥品 G-6926 號

通過PIC/S GMP優良藥廠
五洲製藥股份有限公司
桃園市新屋區赤欄里17-1號