



華興製藥

抗風濕病、抗炎和止痛製劑

“華興”舒痛定 膜衣錠 20 公絲

(特若西卡)

Sutondin F.C. Tablets 20mg "H.S."
(Tenoxicam)

衛署藥製字第 043458 號(G-6936)

【簡介】

Tenoxicam：能止痛、抗炎、解熱及抑制血小板的凝集，能強烈抑制 Prostaglandin 的生化合成作用。在 leukocyte peroxidase 試驗，本藥可消除發炎部位的活性氧，這些藥理作用可用來解釋治療肌肉骨骼系統疾病及痛性發炎的原因。

Tenoxicam 在動物並無突變性、致癌性及胎兒畸形的報告。在動物安全實驗發現 tenoxicam 如同 prostaglandin 抑制劑能作用於腎及腸胃道及增加難產和延遲分娩的發生率。

【成分】

每錠含：Tenoxicam..... 20mg

【賦形劑】

Lactose、Starch、Magnesium Stearate、Talc、Hydroxypropyl Methylcellulose 606、Hydroxypropyl Methylcellulose 615、Polyethylene Glycol 6000、Titanium Dioxide、Tartrazine Aluminum Lake、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake、Brilliant Blue FCF Aluminum Lake、New Coccine Aluminum Lake.

【適應症】

風濕性關節炎、變形性關節疾病、關節粘連性脊椎炎、關節炎疾病：腱炎、滑囊炎、肩部及臀部的關節周圍炎、拉傷、扭傷，急性痛風。

【用法用量】

標準劑量：除了急性痛風關節炎外，所有症狀可以每天同一時間給藥 20mg(1 錠劑)，必須和水吞服。長期治療的病人每天可以投予維持劑量 10mg (1/2 錠)。急性痛風關節炎每天建議劑量 1 次 40mg (2 錠)投予兩天，然後每天 20mg (1 錠)連續給藥 5 天。

特別劑量：上述建議劑量原則上亦適用於老年、肝及腎疾患者。但由於缺乏足夠的臨床經驗，因此 18 歲以下的劑量尚未建立。

本藥須由醫師處方使用。

【副作用】

每日給藥 20mg，在 2 週—1 年的臨床試驗發現本藥具有很好的耐受性。病人在臨床副作用約為 12.5%，這些副作用輕微並且為暫時性，如繼續投藥，則這些副作用通常會消失，大約祇有 1% 痘人須要停藥。

根據臨床實驗可能會有副作用如下：

幾週—3 個月的治療：11%：腸胃道(胃痛、胃灼熱、噁心、下痢、便祕等)；3%：中樞神經系統(眩暈、頭痛)；1—2%：皮膚(搔癢、紅疹、蕁麻疹)。1—2%：泌尿道和腎臟(BUN 或 creatinine 的增加)。1—2%：肝膽(SGOT,SGPT,gamma-GT,bilirubin 的增加)。長期研究(12—48 個月)並未發現有任何副作用頻數增加的現象。

【藥物相互作用】

在建議劑量下和制酸劑 probenecid、cimetidine、glibornuride、tolbutamide、warfarin 及 phenprocumon 並不會產生相互作用，但如和其他 NSAIDs 合用，如 salicylate 會取代 tenoxicam 在蛋白結合處的位置而增加本藥的廓清率及分佈容積。本藥和抗高血壓劑合用，並無血壓及心跳改變的發現，臨牀上亦無與毛黃鹼相互作用的報告。本藥不能和留鉀的利尿劑合用，除非進一步的資料證實，否則不能排除可能減低利尿劑的效果。

【注意事項】

- 對本藥過敏或者服用 salicylate 及非類固醇類抗炎藥而誘發氣喘、鼻炎和蕁麻疹與罹患胃炎、胃及十二指腸潰瘍的上部腸胃疾患的病人均不適用本藥。因為可能增加腎衰竭及止血不全的危險性，麻醉及手術的病人不能投與本藥。
- 避免和 salicylates 及其它 NSAIDs 合用，以免增加腸胃道的副作用。
- 除非病人能就近監視，否則避免和抗凝血劑或口服抗糖尿病藥一齊服用。
- 由於本藥具 prostaglandin 合成抑制作用，對腎功能有負面的影響，因此如下的病人：先前存在的腎臟疾病、腎功能不全時的糖尿病患者、肝臟硬化、充血性心衰竭、體液耗竭、和利尿劑併用時、和具腎毒性的藥物併用時，可能增加腎衰竭的危險性，腎功能監視(BUN,creatinine，水腫的發生，體重增加等)是必要的。
- 孕婦使用：雖然在動物研究並無胎兒畸形的報告，但是在人類有關孕婦及授乳的安全尚未建立。
- 請置於孩童取用不到之處。

【包裝】

2~1000 錠瓶裝及鋁箔盒裝。

本品代號：Sutondin 179

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

服務專線：(04)8832121~6