



易得好膜衣袋20毫克

(膜衣袋)

Tablets 20mg (Famotidine) "EVEREST"

Winifui F.C.

【成分】

"胃康好" 胃药袋，每一片含有效成分20mg的白色薄膜。
抗酸药，H2受体阻滞剂，抑制胃酸分泌之药物。本药之主要
成分为 Famotidine 40mg，分一次或二次服用（早晚各一袋，
每次服量、一日两次）。饭前或饭后服用，饭后效果更佳。
【适应症】

【用法、用量】

Famotidine 40mg，分一次或二次服用（早晚各一袋，
每次服量、一日两次）。饭前或饭后服用，饭后效果更佳。
【注意事项】

4. 本剂之治疗需服食数日后的症状：因此需在服药数天后
观察疗效，服药时勿咀嚼或吞服，以免影响吸收。
(4) 胃炎者 (本药主要由胃吸收，胃炎者因功能降低，所以需有血中
红细胞减少，贫血状态：早有，服有胃粘膜保护药，其中止服药。
(3) 有肝脾肿大之患者 (药物吸收延缓化)。
(2) 有胃炎者，服药时勿咀嚼或吞服，以免减少吸收量或降低药效。
(1) 有溃疡者，服药时勿咀嚼或吞服，以免减少吸收量或降低药效。

① 体质：早有，但需仔细观察，有胃病史者，其中止服药。
② 久泻者。体质：体质不强，体质虚寒，体质虚寒，体质虚寒。
③ 便秘者：体质不强，体质虚寒，体质虚寒，体质虚寒。
④ 血液：早有血小板减少、溶血性贫血、白细胞减少，体质虚寒。
⑤ 肝炎：早有全身疲惫、精神萎靡、食欲不振、口渴、恶心、呕吐、腹部胀满
等症状。

⑥ 溃疡：早有便血、皮疹、荨麻疹、过敏性紫癜，其中止服药。
⑦ 胃炎：早有月经过多、女性乳房等、若有此情形，其中止服药。
⑧ 其他：早有腹痛、腹泻等。

【禁忌】

1. 胃炎者之体质尚未确立，多属体质可能需要的人，最好不要服
用。而且，由其体质可分为两种：因此按体质服药，通常不需要
2. 避免使用之副作用：

1. 有胃炎及胃溃疡 (peptic) 分泌之抑制作用。

2. 0.1~0.2mg/kg之抑制因子，有增加胰岛素之胃酸分泌之倾向。
3. 颈部收缩，饭后1~3小时达到高峰。血中之半衰期约3小时。

【副作用】

Cyclohexyl Mannitol TAG、Microcrystalline Cellulose、Crosslinked Sodium
Magnesium Stearate、Hydroxy Propyl Methyl Cellulose、Talc、Titanium
Dioxide、Polyethylene Glycol 6000、Printing Ink

【储存】

4~1000粒装聚丙烯瓶装。

温度25°C以下，避光贮藏。

總經理電話: 05-2218686 (代表號)
臺灣製藥工業三路6-3號
EVEREST

尺寸 : 13x40cm
104.7.7 一楼