"永勝"為您好富纖散 485.7 公絲/公克

Fusan Soft Powder 485.7mg/gm "Everest"

[劑型]

富纖是一種微粒散劑，可將 3.5~7 克富纖以 240ml 冷開水溶解攪拌均勻後服用，富纖為天然纖維素。

[臨床藥理]

便秘可說是大便的排出受到不正常阻延。排便反射有賴於上直腸部平滑肌肉的神經感受器，當其張度達到某一個臨界點時，此平滑肌即行收縮，並與腹壁之收縮，內肛門括約肌之鬆弛，以及外肛門括約肌之開啟等整個複雜過程相輔相成。

便秘發生原因可能與飲食習慣、排便習慣、生活方式、瀉劑的使用以及情緒問題有關。便秘時會造成腹部不舒服以及排便時必須用力，對身體可能造成不佳影響，而且有時會造成原先存在之肛門與直腸病灶惡化，無論如何，便秘本身是不成什麼大害。但如有突發之嚴重便秘，可能是腸道的神經、血管或肌肉之完整協調或是相關的排便反射有了毛病。

而富纖中含有天然的纖維素，增添糞便及維持糞便中水份而產生軟化的糞便，使服用者排便舒暢。

富纖所含天然纖維素，可軟化糞便而促成排便時間規律化，而且於糞源軟化的同時可以加速糞便通過直腸，避免憩息炎的發生。

[成分]每公克散劑含：

Ispaghula Husk (Psyllium).....485.7mg

Potassium chloride.....7.14mg

Dextrose.....314.86mg

[適應症]

軟便

[用法、用量]

成人及 12 歲以上 1 日 1~2 次，1 次 3.5 公克（半包或 1 匙）~7 公克（1 包或 2 匙），一日以 2 次為限，於早晚，空腹時服用。初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。

[服用方法]將本劑 3.5~7 公克加在 240ml 冷開水中攪拌均勻服用。

醫師藥師藥劑生指示藥品

[注意事項]

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
5. 瀉劑不應長期使用，一但排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得使用連續使用一星期以上，應儘量以含纖維飲食，並充分攝取水分及運動來改善便秘。

[警語]

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 內服製劑使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
4. 若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
5. 使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
6. 使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
7. 除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿 3 歲之嬰幼兒不得使用。
8. 禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心、腸道潰瘍、狹窄粘黏之患者。
9. 需 12 小時至三天才會發生作用。
10. 不適用於須限制水份之患者。
11. 使用時須依指示加足量水服用，否則易引起胸痛、嘔吐、口水過多、容易嗆到等食道阻塞之症狀或徵候，須停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

[賦形劑]Sodium Chloride、Potassium Chloride、Citric Acid、Sucrose、Dextrose、Food Red No.7 (Al-lake)、Food Yellow No.4、Titanium Dioxide、Polyvinyl Pyrrolidone、Flavor(Peach)、Sodium Saccharin。

[保存方法]室溫（25℃）保存。

[包裝]28-1000 公克塑膠瓶、7 公克/包，4-142 包鋁箔袋裝。

衛署藥製字第 043542 號

永勝藥品工業股份有限公司
EVEREST
嘉義頭橋工業區工業三路6-3號
諮詢電話:05-2218686(代表號)