外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	"派頓"復爾朗眼藥水 1.0公絲/公撮(膚樂每爽)	申請廠商	臺灣派頓化學製藥股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製 字 第 043589 號		



（成 分）：每公撮中含有
Fluorometholone……1.0mg
（適應症）：外眼部和前眼部的炎症性患者（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，上強膜炎，虹彩炎，虹彩毛樣體炎）。
（用法用量）：每日2～4次，一次1～2滴，搖盪均勻後再使用，本藥須由醫師處方使用。
注意事項：請詳閱說明書後使用。

"派頓" G.M.P.藥品
復爾朗®
眼藥水 1.0公絲/公撮(膚樂每爽)
Fluorone®
Ophthalmic Solution 1.0mg/ml "Patron"
(Fluorometholone)
5 ml

衛署藥製字第043589號 G-6986
製造日期：
製造批號：
有效期限：
TPCC 臺灣派頓化學製藥股份有限公司

89. 7. 4-

GMP 藥品 衛署藥製字第 043589 號

"派頓"
復爾朗® 眼藥水

1.0 公絲/公撮 (膚樂每爽)

FLUORONE® Ophthalmic Solution 1.0mg/ml "Patron" (Fluorometholone)

【作 用】：本品具有抗炎效果，可抑制急性炎症之浮腫，毛細血管之擴張，血管新生。對 Steroid 眼壓反應呈陽性患者，依臨床藥理試驗，眼壓上升僅 Betamethasone 之 1/8～1/10。若用 0.02%眼藥水時，眼壓上升不超過 6mmHg。

【成 分】：
每公撮中含有：Fluorometholone……………………………1.0mg

【適 應 症】：
外眼部和前眼部的炎症性患者(眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，上強膜炎，虹彩炎，虹彩毛樣體炎)。

【用法用量】：
每日 2～4 次，1 次 1～2 滴。搖盪均勻後再使用。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：
1. 對本劑有過敏性及既往患者禁用本品。
2. 對角膜潰瘍患者、濾過性病毒結膜角膜疾患者、結核性眼疾患者、真菌性眼疾患者或化膿性眼疾患者，原則上不使用本品治療，然而必須使用時，宜慎重使用。
3. 本品使用於懷孕婦女、幼兒、小孩之安全資料尚未確立，尤其未滿 2 歲孩童，須慎重使用。
4. 副作用：眼壓上升，創傷治癒的遲延；長期使用，腦下垂體，副腎皮質系機能受抑制。
5. 儲藏於室溫，避光保存。

【包 裝】：
100 公撮以下 塑膠瓶裝

台灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄縣岡山鎮爲隨東路五十號
TEL：(07)6216126～8

3A

※外文仿單應檢附中文譯文

註

(1)報核仿單標籤以粘貼全型實物爲原則。

(2)仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。



102年依公告刊登照修前核備仿單

G-6986
衛署藥製字第043589號

cGMP藥品

"派頓" 復爾朗® 眼藥水

1.0公絲/公撮(膚樂每爽)

FLUORONE® Ophthalmic Solution 1.0mg/ml "Patron" (Fluorometholone)

【作　　用】：本品具有抗炎效果，可抑制急性炎症之浮腫，毛細血管之擴張，血管新生。對Steroid眼壓反應呈陽性患者，依臨床藥理試驗，眼壓上升僅Betamethasone 之1/8 ~ 1/10。若用0.02%眼藥水時，眼壓上升不超過6mmHg。

【成　　分】：每公撮中含有：Fluorometholone..1.0mg

【 賦形劑 】：Hydroxypropyl Methylcellulose 606, Sodium Chloride, Benzalkonium Chloride Sodium Phosphate Monobasic, Sodium Phosphate Dibasic, Purified Water.

【適 應 症】：外眼部和前眼部的炎症性患者(眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，上強膜炎，虹彩炎，虹彩毛樣體炎)。

【用法用量】：每日2 ~4次，1次1 ~2滴。搖盪均勻後再使用。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

1. 對本劑有過敏性及既往患者禁用本品。
2. 對角膜潰瘍患者、濾過性病毒結膜角膜疾患者、結核性眼疾患者、真菌性眼疾患者或化膿性眼疾患者，原則上不使用本品治療，然而必須使用時，宜慎重使用。
3. 本品使用於懷孕婦女、幼兒、小孩之安全資料尚未確立，尤其未滿2歲孩童，須慎重使用。
4. 副作用：眼壓上升，創傷治癒的遲延；長期使用，腦下垂體，副腎皮質系機能受抑制。
5. 儲藏於室溫，避光保存。

【包　　裝】：100公撮以下塑膠瓶裝。

PATRON®

臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄市岡山區為隨東路50號 TEL:(07)6216126