

艾迪乳膏 ID Cream

【副作用】

本藥使用期間偶有局部刺激、發紅、搔癢、接觸性皮膚炎及疼痛現象發生，通常停藥後即可恢復。

【成分】每g含：

Isoconazole Nitrate.....10mg
Diflucortolone Valerate.....1mg
賦形劑：Cetyl Alcohol, Mineral Oil,
Isopropyl Myristate, Cream Base
Wax, Polyoxyethylene(25) Cetyl
Ether, Glyceryl Monostearate,
Methyl Paraben, Civet Musk 5753,
Peppermint Oil, Purified Water.

【作用】

1. Isoconazole Nitrate為Imidazole類之抗微生物劑，具有抗微菌的效果。
2. Diflucortolone Valerate為副腎皮質類固醇可抑制發炎和過敏性，以及減輕主訴狀如搔癢、燒灼痛感。

【適應症】

指(趾)間、手部、腹股溝之微菌感染。

【用法用量】

一般每天使用二次，塗敷於皮膚患處、指(趾)間，通常建議放置塗上本劑之紗布。本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】

1. 曾對Isoconazole Nitrate及Diflucortolone Valerate產生過敏反應之患者禁用本藥。
2. 患有結核病與梅毒需治療的皮膚部位。
3. 病毒性感染，如：單純性皰疹、牛痘、水痘及天花。

【注意事項】

1. 使用本藥期間若發生嚴重之刺激或過敏反應時，應立即停止使用並就醫。
2. 不建議長期使用，因為長期使用可能導致局部皮膚萎縮、變薄、失去彈性、淺表血管擴張及毛細血管擴張過緊的衣服。
3. 當大量或大面積使用可能會導致類固醇的全身作用。
4. 若有繼發細菌性皮膚感染，應該與其他抗微生物藥物合併使用。
5. 本藥使用於臉部時，應避免接觸眼睛。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦不建議使用。

【儲存】

請儲存於30°C以下。

【包裝】

1000公克以下鋁軟管裝及塑膠瓶裝。

委託者：國信藥品股份有限公司
地址：新北市新興路222號
製造廠：嘉壽元化學工業股份有限公司
地址：新竹市新民路128號