

華樺生技藥品股份有限公司

副腎皮質荷爾蒙劑

敏 疫 朗 錠 4 毫克

(甲基培尼皮質醇)

*Methyldone Tablets 4mg
(Methylprednisolone)*

衛署藥製字第 043761 號(G-7092)

《簡 介》

本品為合成之腎皮質荷爾蒙，為人類維持生命所必須之內分泌物，抗風濕作用，副腎控制作用與 prednisolone 同程度；無鈉貯留作用。

《成 分》

每錠含：Methylprednisolone 4mg

《賦 形 劑》

Lactose、Starch、Sodium Starch Glycolate、Povidone K-30、Magnesium Stearate、Talc、Erythrosine。

《適 應 症》

風濕性熱、風濕樣關節炎及過敏性症狀。

《用法用量》

1 天 1-12 錠，分 1-4 次服用（增減）。本藥須由醫師處方使用。

《副 作 用》

- 可能誘發感染症，或感染症惡化的現象。
- 可能有續發性副腎皮質機能不全、糖尿病、月經異常等現象出現。
- 可能有消化性潰瘍、肺炎、下痢、噁心、嘔吐、胃痛、胸部發燒、口渴、食慾不振、食慾亢進的現象出現。
- 偶爾有精神變調、昏睡、不眠、頭痛、眩暈、痙攣的現象出現。
- 偶有骨疏鬆症、大腿骨及上腕骨等的骨頭無菌性壞死、筋肉痛、關節痛的現象出現。
- 偶有滿月樣顏貌、野牛肩、窒素負平衡、脂肪肝的現象出現。
- 偶有浮腫、血壓上升、低鉀性中毒現象出現。
- 連續使用，可能會有眼壓亢進，後囊白血障、綠內障、眼球突出的現象出現。
- 偶有白血球增多、血栓症的現象出現。
- 偶有痤瘡、多毛、脫毛、色素沉澱、皮下溢血、紫斑、綠條、癢癢、發汗異常、顏面紅斑、創傷治療障礙、皮膚菲薄化、脆弱化、脂肪纖炎的現象出現。
- 出現過敏症狀停止服用。
- 其他偶爾有發熱、疲勞感、類固醇腎症、體重增加的現象出現。

《注意事項》

- 可能會有誘發感染症、續發性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍、糖尿病、精神障礙等嚴重副作用產生，應慎重投與；長期使用，突然停止，可能會有發熱、頭痛、食慾不振、脫力感、筋肉痛、關節痛、休克症狀等的現象出現，這時應徐徐減量。
- 對本劑過敏的既往歷史者為禁忌。
- 原則上不對以下的患者投與，除非特別必要，但必須慎重投與：全身真菌症患者、消化性潰瘍患者、精神病患者、結核性疾患者、單純疱疹性角膜炎患者、後囊白內障患者、綠內障患者、高血壓症患者、電解質異常患者、血栓症患者、最近行內臟手術患者、急性心肌梗塞患者。
- 對以下患者慎重投與：感染症患者、糖尿病患者、骨質疏鬆症患者、腎不全患者、甲狀腺機能低下患者、肝硬變患者、脂肪肝患者、脂肪塞栓症患者、重症肌無力症患者。
- 出現副作用症狀時，做適量之處置。
- 妊娠、授乳婦的投與：有畸畸形作用，引起新生兒副腎不全，妊娠妊娠可能會向母乳中移行，慎重考慮後投與。
- 小兒的投與：有小兒發育抑制現象，長期投與，有頭蓋內壓高進症狀出現。
- 和巴比妥酸誘導體、phenytoin、rifampicin 併用，會減弱本劑的作用，與水楊酸誘導體併用，會增加血中水楊酸誘導體濃度，引起水楊酸中毒，併用時應注意用量。
- 併用會減弱抗凝血劑，經口糖尿病用劑的作用。
- 與利尿劑併用，有時會出現低鉀血症現象。
- 副腎皮質荷爾蒙劑投與中患者，接種疫苗，曾有神經障礙，抗體反應欠缺的報告。

《儲 存》

儲存於25°C 以下。

《包 裝》

2~1000 粒瓶裝及鋁箔裝。

委託者

華樺生技藥品股份有限公司
彰化縣田尾鄉中山路一段94之2號2樓

製造廠

華興化學製藥廠股份有限公司
彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號