衛署藥製字第043766號
GMP・G-7097

表皮止痛用的局部麻醉劑

麗膚樂乳膏

Lipro Cream

【成　　份】：每公克含：
Lidocaine……25mg
Prilocaine…… 25mg
賦形劑:Mineral Oil, Cetyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Cream Base Wax, Polyoxyethylene(25)Cetyl Ether, Glyceryl Monostearate, Methyl Paraben, Purified Water.

【說　　明】：
Lipro乳膏是一種由Lidocaine及Prilocaine以1:1比例形成的油/水性乳劑，這種製劑具有皮膚麻醉作用且適用於表皮處理。
緊密敷料，上藥至少60分鐘後可以達到最大的麻醉作用。於卸除覆蓋膜及藥物後應馬上做處置（請見適應症），卸除敷料後約可持續30分鐘的麻醉作用。Lipro因對小血管的生理影響而會有暫時性的蒼白或潮紅。

【適 應 症】：
與下列狀況有關的皮膚表面止痛：
1. 插針，如靜脈注射導管或抽血前。
2. 表皮外科處置。
3. 生殖器黏膜，如表皮外科處置前或浸潤麻醉前。

【用法用量】：
本藥限由醫師使用。
在皮膚上敷上一厚層藥物並緊密敷料覆蓋。靜脈插針，推薦使用約2g，必須於進行處置前至少一小時敷用Lipro乳膏，若不將它卸除，可持續作用數小時之久。

一歲以下的嬰兒使用請參考注意事項。

【禁 忌 症】：
對醯胺類局部麻醉劑過敏者。

【注意事項】：
Lipro乳膏不可放在傷口上、黏膜上或有異位性皮膚炎的病患，應避免敷在眼睛附近。除非有更進一步的臨床資料，對於孩童使用應觀察以下的注意事項：
1. 早產兒不可使用Lipro乳膏。
2. Lipro乳膏應避免使用在六個月以下的嬰兒。
3. 6-12個月大的小孩，用一時間內不可使用Lipro乳膏超過2個部位。敷用Lipro乳膏至少需1小時，但不可超過2小時。
4. 某些藥物（如Sulphonamide)可能會加重使用Lipro乳膏患者其變性血紅素血症的形成。

【妊娠與授乳】：
Lidocaine和Prilocaine會分泌至乳液中，然而由於全身性的吸收極低，因此對嬰兒產生副作用的危險很小。

【副 作 用】：
鮮有水腫、發癢或發疹的報告。高劑量下的Prilocaine可能會造成methemoglobin的濃度上昇。（請參考注意事項，曾有一名三個月大嬰兒使用後產生變性血紅素血症的報告）。有極罕見的症例是對局部麻醉劑會產生過敏反應的情形，(最嚴重的病例是發生過敏性休克)。

【包　　裝】：
1000公克以下塑膠瓶、鋁管裝。

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號