衛署藥製字第043831號
GMP:G-7129

"內外" 感服寧 雙層錠
Fumon Tablets "N.W."

醫師藥師藥劑生指示藥品

傷風感冒之理想治療劑，添加維他命C，增加對感冒的抵抗力。無嗜睡副作用，雙層錠多重藥效。

【作用】由於所含的各成分係以適當的比例，調配而成，故能迅速解除感冒、流行性感冒和其他呼吸道感染症所引起的惱人症狀。

1. Acetaminophen是一種耐受性極佳的止痛劑，對胃無刺激性，對解除中度疼痛有效；亦可解除頭痛和由感冒而帶來的其他疼痛。它的解熱性質亦可降低由呼吸道感染症所引起的發燒。
2. Phenylephrine Hydrochloride是一種耐受性佳，鼻充血解除劑，能治療感冒所引起的鼻塞；迅速收縮充血之鼻黏膜，停止流鼻水而促進鼻道的暢通，恢復自由、舒適的呼吸。
3. Noscapine的主要作用是止咳；它能降低過敏性咳嗽的次數和嚴重性，對於支氣管哮喘的病人，不像Codeine那樣會產生支氣管收縮作用，而且對支氣管分泌物沒有乾燥的作用；按照重量為基準，它的止咳作用和Cedeine相當。
4. Caffeine是一種興奮劑，協助解除感冒所引起的疲勞，促進清醒使您倍感舒適。
5. Ascorbic Acid能刺激抗體的產生，增加對感冒的抵抗力，因而促進感冒迅速痊癒。
6. Terpin Hydrate是一種有效的祛痰劑，能解除呼吸道黏膜乾燥所引起的乾咳。

【成分】Each Tablet contains:

Acetaminophen	300 mg	Noscapine	10 mg
Terpin Hydrate	20 mg	Phenylephrine Hydrochloride	5 mg
Caffeine Anhydrous	15 mg	Ascorbic Acid	30 mg

【適應症】：緩解感冒之各種症狀(鼻塞、咽喉痛、咳嗽、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)。

【用法用量】：成人：每次一錠，每天三次。

【副作用】

1. 偶有過敏反應。
2. 在建議劑量下使用少有副作用發生。
3. 長期服用超大劑量會引起肝毒性，在兒童急性中毒劑量小於150 mg/kg。
4. 神經質、興奮、睡不著與心搏加快。
5. 暈眩、神經質、躁動、顫抖、呼吸困難、虛弱、臉色蒼白。

【警語及注意事項】

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 若為液劑，使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
6. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，服用本類藥品時不得併服其他藥品。
7. 不得併服含酒精飲料。
8. 苯酮尿症(Phenylketonuria)患者不得服用本類藥品。
9. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
10. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，3歲以下不建議自行使用。
11. 含咖啡因之本類製劑，12歲以下之患者不得服用。
12. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
13. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
14. 吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本類藥品。
15. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
16. 不要使用本類藥物超過七天。
17. 服用本類藥品後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三天，應停藥立即就醫。
18. 服用本類藥品後，如果喉嚨疼痛持續二天以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
19. 服用本類製劑應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。
20. 肝毒性：
    (1) 使用Acetaminophen (Paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的Acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含Acetaminophen成分之藥品。
    (2) 過量服用Acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有Acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。
    (3) 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用Acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有Acetaminophen或Paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有Acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的Acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
21. 與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用Acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。
22. 過量：
    (1) 服用過量Acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
    (2) 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
    (3) Acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。
23. 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用Acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對Acetaminophen過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。
24. 嚴重皮膚反應：使用Acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【保存】於25℃儲存，並置於小兒伸手不及處。

【包裝】6~1000錠鋁箔盒裝。

N.W. cGMP
內外化學工業股份有限公司
雲林縣斗六市斗六工業區復興路 3 號