

“台裕” 舒樂康 注射液 20 毫克/毫升

Sorocam Injection 20mg/ml “Tai Yu”

「“台裕”舒樂康注射液 20 毫克/毫升」為非類固醇抗炎劑 Piroxicam 之肌肉注射液。本藥具有鎮痛、解熱及抗炎作用。

【成分】

Each ml contains:

Piroxicam.....20.0mg

【作用】

1. Piroxicam 是屬於 Oxicam 系之非類固醇抗炎劑，具有鎮痛、解熱、抗炎及抑制血小板功能等作用；這些作用均與抑制前列腺素之合成有關。
2. Piroxicam 之藥動學為線性，研究顯示 Piroxicam 之藥動學在各年齡層上並無改變。
3. 吸收：注射 Piroxicam 後之血中濃度比口服高，第一天 45 分鐘、第二天 30 分鐘即達最高血中濃度。兩劑型間具有生體相等性。
4. 分佈：半衰期約 50 小時。肌肉注射 40mg 後，於 45 分鐘(Tmax) 可得 Cmax 3.8µg/ml。血漿蛋白結合率很高。約 99%。Piroxicam 在滑膜的濃度通常比在血中濃度高 45~50%；在母乳中之含量約為母體血中濃度之 1~3%。
5. 代謝與排泄：Piroxicam 之排泄很慢，但幾乎可完全代謝；小於 5% 以原形由尿液及糞便排出。其主要代謝途徑為先由側鏈之 pyridyl 起 hydroxylation 作用及一系列反應，最後以 glycuconjugation 型式排出。

【適應症】

類風濕性關節炎、幼年型類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)、僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷、急性痛風、原發性痛經。

【用法及用量】

本藥限由醫師使用。

1. 限用於成人及 15 歲以上兒童。
2. 風濕痛：每日一次注射 20mg。
3. 每日用量不可超過 40mg，治療期間為 2~3 日。
4. 本藥僅限於無法口服或使用肛門塞劑時使用。
5. 本藥限供肌肉注射，宜在臀部外上 1/4 處消毒後深部緩慢注射。建議更換每次注射部位，必須反抽針筒以確認針管未刺及血管。注射時如發生嚴重疼痛，應即停止注射；如遇人工髖關節，應換另一部位注射。

一、禁忌症：曾對此藥過敏之患者，不能再使用。

二、警告：

對孕婦：雖然動物實驗並未顯示此藥有催畸作用，但孕婦及授乳婦人使用此藥是否安全，尚未確定，本藥作用於前列腺素合成酶 (PROSTAGLANDIN BIOSYNTHETASE)，會抑制前列腺素之合成及分泌。其他非類固醇抗炎劑亦具此種作用，已知此作用與服用此類藥品的懷孕動物之難產及延遲分娩有關。

兒童：兒童在何種情況下可服用此藥及其劑量如何等問題均尚未確定。

三、注意：

服用此藥可能會引起消化性潰瘍或胃腸出血。故有胃腸病之患者，服用此藥時須特別注意。

少數病人於服用非類固醇抗炎劑 (包括本藥) 期間，會有血中尿素氮增加之現象。惟此種增加之現象，會止於一定之限度，且停藥後便會恢復正常，又血中尿素氮之增加與血清肌酸量之增加無關。

四、不良反應：

常見之副作用除胃腸方面以外，少數病人會出現水腫，尤其是踝部水腫，一般常規檢眼鏡檢查及裂隙燈檢查，皆未發現病人之眼睛有任何變化，又有些人會發生與胃腸出血無關之血紅素或血球容積減少。亦有人曾經發生肝機能之變化。大多數非類固醇抗炎劑包括本藥，皆會使部分病人之血清轉胺基酶量(SGPT)增加。

五、過量：

服用過量時，可對病人採取支持及對症療法。

【賦形劑】

Propylene Glycol、Benzyl Alcohol、Niacinamide、Sodium Phosphate Dibasic、Sodium Sulfite Anhydrous、Meglumine、Sodium Hydroxide、Citric Acid、Edetate Disodium、Water for Injection。

【貯藏方法】

室溫避光(陰涼處)貯存。

【包裝】

1ml、2ml 安瓿裝，100 支以下盒裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL: (03)5826655 FAX: (03)5822389