"永勝"

樂皮寧乳膏1.0%

Terbina Cream 1.0% "EVEREST"

【成分】
Terbinafine hydrochloride……10mg

【性狀】
Terbinafine是Allylamine的衍生物，具有抗黴菌作用。對皮癬菌(Dermatophyte)、霉(mould)及某些同質二形性黴菌(Dimorphic Fungi)、具有殺黴菌作用。對酵母菌(Yeast)的作用，則依不同的種屬，而有殺黴菌(Fungicidal)或抑黴菌作用(Fungistatic)。Terbinafine可干擾黴菌生合成麥角硬脂醇(Ergosterol)的先期步驟，導致麥角硬脂醇不足，且因細胞內積聚過多的Squalene引起黴菌死亡。Terbinafine的作用機轉是抑制黴菌細胞膜上的Squalene epoxidase，此酵素的作用與細胞色素P450系統(Cytochrome P450 system)無關，且Terbinafine並不會影響荷爾蒙或其它藥物的代謝。

Terbinafine在體外最低抑制濃度

【敏感菌種】	μg/ml
Trichophyton rubrum	0.003-0006
Trichophyton mentagrophytes	0.003-0.01
Trichophyton tonsurans	0.003
Trichophyton verrucosum	0.003
Trichophyton schonleinii	0.006
Microsporum canis	0.006-0.01
Microsporum versicolor	0.003
Microsporum gypseum	0.006
Epidermophyton floccosum	0.003-0.006
【中度敏感菌種】	
Aspergillus fumigatus	0.1-1.56
Sporothrix schenckii	0.1-0.4
Candida albicans:Yeast	25-100
Hyphae	0.23-0.7
Candida parapsilosis fumigatus	0.1-0.4
Pityrosporum ovale	0.2-0.8
Pityrosporum orbiculare	0.8

酵母菌中如candida albicans對terbinafine的敏感性是體內比體外高。

【藥物動力學】
外用僅低於5%的劑量被吸收，全身性的作用非常輕微。經身體代謝後的代謝物並無抗黴菌的活性，且主要由尿液及糞便排出。排除半衰期為17小時，並無蓄積現象。

【適應症】
治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

【用法/用量】
醫師藥師藥劑生指示藥品。
樂皮寧乳膏可一天使用1至2次，在使用樂皮寧乳膏前須將患部清理乾淨和乾燥，將樂皮寧乳膏少量塗抹於患部，並均勻摩擦於患部。如有破皮感染現象(乳腺下、指間、臀部、腹股溝間)，在塗抹樂皮寧乳膏後可覆蓋上紗布，特別是在夜間。

【一般治療期間】

股癬	1-2週
足癬(如果一天使用2次則治療期可縮短為一週)	2-4週
汗斑	2週

通常在使用樂皮寧乳膏數日後才有症狀減輕的現象，不規律或提早停止使用樂皮寧乳膏會造成再復發現象，在治療2週後如沒有明顯的改善，需重新評估其診斷。

【老年人】
尚無証據建議老年人的劑量需與年輕人不同或有不同的副作用。

【一般】
使用樂皮寧乳膏時，必須保持良好衛生以防再度感染(如從內衣、襪子、鞋子等)

【警語】
對藥物各成分或賦形劑過敏者不得使用。

【副作用】
1.局部皮膚刺激及灼熱感。
2.紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。這些無害的症狀偶爾會於使用部位發生，須與過敏反應有所區別，但不必為此而停止使用本產品。
3.過敏性皮膚炎。過敏症狀一般很少發生，但須停止使用本產品。

【交互作用】
尚未有樂皮寧乳膏與其他藥物有交互作用報告。

【注意】
1.須置於小孩接觸不到之處。
2.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦或授乳婦，不建議自行使用。
3.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
4.本劑限於皮膚外用不得內服或使用眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。塗藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
6.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染，深部皮膚組織感染請就醫治療。
一般黴菌治療一星期症狀會改善，至少治療二星期且須完成全程療程。股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情復發應停藥立即就醫。

【賦形劑】Cetyl Palmitate、Stearyl Alcohol、Cetyl Alcohol、Isopropyl Myristate、Benzyl Alcohol、Methyl Paraben、Glyceryl monostearate、Span 60、Sodium Lauryl Sulfate、Citric Acid、Purified Water。

【架儲期】樂皮寧乳膏不可超過印於包裝上之有效期間使用。

【貯存】25℃以下乾燥處。

【包裝】1000公克以下塑膠瓶裝、鋁管裝。

衛署藥製字第044028號

製造廠：永勝藥品工業股份有限公司
EVEREST
嘉義頭橋工業區工業三路6-3號
諮詢電話:05-2218686(代表號)

經銷商：友聯生技醫藥股份有限公司
台中市北區進化北路392-2號11樓之2
諮詢電話：0800-895168