

2.9cm



“永信”

骨骼肌弛緩劑

SFT-004  
衛署藥製字第044114號  
Code No.:38289

速得舒®

Suflex®

錠 200公絲

Tablets 200mg  
"Yung Shin"

【成 分】每錠中含：

Mephenoxalone.....200mg

【賦 形 劑】

Lactose、Silicon Dioxide Colloidal、Magnesium Stearate、Methylhydroxypropylcellulose、Ethyl Cellulose、Microcrystalline Cellulose、Povidone、Stearic Acid。

【作 用】

如所週知，導因於脊髓的風濕痛，大部份係由骨骼肌痙攣所引起。本藥主成分Mephenoxalone能有效地消除骨骼肌痙攣或痙攣所產生的疼痛，Mephenoxalone乃經由抑制神經衝動的傳導通過，導致骨骼肌痙攣的反射弧而產生骨骼肌鬆弛作用。因Mephenoxalone係經由神經系統作用產生肌肉鬆弛而緩解引起疼痛的肌肉痙攣及痙攣，故風濕痛、斜頸、腰痛、肌痛、肌肉僵硬等患者服用本藥後很快能消除疼痛症狀而恢復行動自如。因Mephenoxalone的肌肉鬆弛作用能使精神弛緩，故本藥對神經緊張、焦慮、神經過敏等也是很好的治療劑。

【適 應 症】

緩解由脊髓或肌肉痙攣引起的疼痛。

【用法 · 用 量】

成人：每天三次於餐中以少量水溶解1～2錠送服，劑量可視症狀之減輕而減少，必要時，若經醫師認可劑量可增至每天8～10錠。

兒童：6～15歲兒童，則每天三次，每次服用1/2錠，用法同上。

本藥須由醫師處方使用。

【禁 忌 症】

曾對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副 作 用】

本藥耐受性極佳，少有副作用發生。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。

2. 於25°C以下儲存。

3. 請在有效期限內使用。

【包 裝】

6～1000錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2150921