

妥方[®] 乳膏 10毫克/公克Terfine[®] Cream 10mg/g

妥方[®]乳膏是抗黴菌藥，在低濃度時，有效成分Terbinafine具有殺黴菌之作用，使黴菌細胞死亡，用於以下皮膚黴菌感染：

- 癬感染，如：香港腳(足癬)、腹股溝和大腿內側區域等皺褶處搔癢(股癬)等。
- 酵母菌感染，如：好發於炎熱天氣或出汗時的汗斑，常見於頸部至腰部的身體部份，頸部或手臂部位。

妥方[®]乳膏為局部塗抹，對全身性的影響十分輕微，且無蓄積現象。

【成分】

有效成分及含量：每公克中含有

Terbinafine Hydrochloride.....10mg

其他成分(賦形劑)

Cetyl Alcohol, Stearic Acid, Gelot 64, Isopropyl Palmitate, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Monoglycerine, Sodium Hydroxide, Purified Water

【用途(適應症)】

治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 12歲以下。
 - (2) 有深部皮膚組織感染。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
 - (1) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2) 正在接受醫師治療。
 - (3) 患部在臉上。
 - (4) 患部化膿。
- 其他使用上注意事項
 - (1) 為防止兒童誤食，請妥善保管。
 - (2) 避免陽光直射。
 - (3) 勿超過建議使用量或使用次數。
 - (4) 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
 - (5) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 - (6) 本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等），濕疹，浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
 - (7) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

- (8) 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
- (9) 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用，但如果有破皮感染現象(乳腋下、指間、臀部、腹股溝間)，在塗抹本藥後可覆蓋上紗布，特別是在夜間。
- (10) 一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。
- (11) 使用本藥時，必須保持良好衛生習慣，以防再度感染(例如：保持內衣、襪子、鞋子清潔等)。

【用法用量】

在使用本藥前，請將感染部位清理乾淨並擦乾，將本藥足量均勻塗抹於感染部位。

用途(適應症)	每天使用次數	一般治療期間
體癬、股癬	1~2次	1~2週
足癬	1次	2~4週
	2次	1週
念珠菌表皮感染	1~2次	1~2週
汗斑	1~2次	2週

【警語】

- 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

- 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - (1) 若有上述外之其他不適情況產生。
 - (2) 自覺狀況沒有改善或更惡化。
 - (3) 一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

【包裝】

1000公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

【儲存】

本藥應保存於30°C以下。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第 044132 號

Synmosa

委託者：健喬信元醫藥生技股份有限公司

新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

製造廠：健康化學製藥股份有限公司

台中市大甲區幼獅工業區幼四路12號

