"大豐" ●痛風治療劑●

癒尿酸錠

100毫克（本補麻隆）

YURINOM

Tablets 100mg "T.F." (Benzbromarone)

癒尿酸錠之主成分為Benzbromarone為一高尿酸血症改善劑。可以降低血漿中尿酸濃度，其藥理作用為阻止尿細管尿酸之再吸收；同時可以增加尿液中尿酸的排泄，對整個身體尿酸的排出具極佳療效。

【成分】每錠中含有：

Benzbromarone.....100mg

【賦形劑】

Primojel, Avicel, Lactose, PVP-K90,Sunset Yellow FCF, Tartrazine,Magnesium Stearate。

【適應症】

痛風、高尿酸血症。

【用法用量】

通常成人每日1～2錠，每次1錠，經口投與，依年齡、症狀，適宜增減之。

本藥須由醫師處方使用。衛署藥製字第044140號

【警語及注意事項】

1.癒尿酸錠具有顯著的血中尿酸降低作用，於投與初期有誘發痛風之可能。

2.投與癒尿酸錠時，因尿中之尿酸排泄量會增加，故應將調節尿液PH=6.3-6.7之間，建議病患多喝水為宜以避免腎結石。

3.警語：(1)猛爆性肝炎等嚴重肝臟不良反應主要會在開始投與前六個月內發生，因此最少在最初給藥六個月內，應定期進行肝功能檢查。

(2)在使用期間如有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振，全身倦怠發生時，應立即停止使用本藥品，並到醫療院所就醫檢查。

(3)重度肝功能異常之患者應小心使用。

(4)腎功能異常之患者，建議酌予減量。

4.不可投與於下列患者：

(1)腎結石之患者，嚴重腎機能障害之患者。

(2)懷孕、授乳期之婦女。

(3)肝功能異常者。

5.開始投與本藥品前應先進行肝功能檢查，以確認病人沒有肝功能異常。

6.在使用本藥前須檢查肝功能，以確認有無肝臟疾病。並應告知病人使用本藥可能有肝臟疾病的副作用，如出現食慾不振、噁心嘔吐、疲倦虛弱、腹痛、下痢、發燒、深色尿液、結膜變黃等症狀，應停藥並立即就醫。

7.禁忌症：

(1)對本藥過敏者。

(2)嚴重肝功能不良。

(3)嚴重腎功能不良。

(4)尿酸性腎臟結石

(5)懷孕及可能懷孕的婦女。

8.副作用：

(1)偶有胃腸道副作用，特別是腹瀉。

(2)過敏性：偶有蕁麻疹、發疹、顏色潮紅、紅斑、搔癢感。

9.交互作用：

(1)Salicylate可能減弱benzbromarone的藥效。

(2)Ethacrynic Acid會使benzbromarone失效。

(3)Dicumarol會增加尿酸的排泄。

10.室溫下保存，避免日光直射及受潮，並置於兒童不易取得之處。

【包裝】：6-1000粒鋁箔盒裝

GMP 藥廠

大豐製藥股份有限公司

公司．工廠：彰化市延平里岸頭巷11號

105.6.30-癒尿酸錠-說明書尺寸：83x240mm
Pantone 7425C