注意：請詳閱紙盒內
面說明後使用

2018.04. "中美"

咳速樂糖漿 Cosula SYRUP "C.M."

衛署藥製字第044262號 G.M.P. G-7430

【成　　分】

有效成分及含量：(Each ml contains)
Codeine Phosphate 0.8mg、Phenylephrine Hydrochloride 0.4mg、
Mepyramine Maleate(Pyrilamine melaeate) 0.664mg、
Potassium Guaiacol Sulfonate 6.64mg

其他成分(賦形劑)：Sodium Benzoate、 Caramel、Alcohol、 Tween 80、Sodium Erythorbate、Sucrose、Cond Loquat Flav.68448-H、Mint Flavor、Citric Acid、Sodium Metaphosphate、Glycine、Sorbitol Solution、Purified Water

【用途(適應症)】鎮咳、祛痰（支氣管炎、咽喉炎等引起之咳嗽及喀痰）。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
(二) 具有CYP2D6超級快速藥物代謝酵素的人(ultra-rapid metabolizers)。
(三) 哺乳婦。(四) 未滿12歲。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一) 產婦。(二) 肝、腎功能不全的人。(三) 正在服用血清素作用劑藥品(Serotonergic drugs)的人，包括服用抗抑鬱藥及偏頭痛藥。
(四) 12至18歲，並有下列情形的人
◆ 呼吸功能不全(可能症狀：呼吸困難)　◆ 神經肌肉疾病(可能症狀：肌肉無力)
◆ 嚴重心臟或呼吸系統疾病(可能症狀：胸痛、胸悶)
◆ 上呼吸道或肺部感染(可能症狀：流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛)
◆ 重創傷或近期曾進行大範圍的外科手術。
(五) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
(六)曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
(七) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦、(二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。(三) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項
(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。(二) 避免陽光直射。(三) 勿超過建議使用量。
(四) 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。(五) 不得與酒精性飲料併用。
(六) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

【用法用量】

年齡	每日使用次數
成人及12歲以上	一日2次，每次10ml
12歲以下	請洽醫師診治。

【警　　語】

一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一) 若有任何不適情況產生。
(二) 服藥後出現下列症狀：意識混亂、異常嗜睡、癱軟、呼吸緩慢或微弱、瞳孔變小、噁心、嘔吐、便祕、食慾不振、厭食及低血壓、性慾低下、陽痿或無月經等。
(三) 正在服用血清素作用劑藥品(Serotonergic drugs)，包括服用抗抑鬱藥及偏頭痛藥，可能出現躁動、幻覺、昏迷、心搏快速、體溫過高、協調困難或僵直等症狀。
(四)有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽或有復發情形。

二、如需使用本品，應避免用藥期間以母乳哺餵嬰兒。
三、長期使用本藥品易導致成癮。

【包裝】10~60毫升玻璃瓶裝
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存條件】25℃以下避光儲存

PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號　諮詢專線：04-7524166
http://www.chungmei.com.tw

注意：請詳閱紙盒內
面說明後使用