

# 拔疼錠 50 公絲

## Urisue Tablets 50 mg

網號：C65

### 劑型、含量：

Each Tablet contains：Benzbromarone.....50mg

### 臨床藥理：

1. 藥理作用：本劑投與於痛風患者結果，使血清尿酸值降低及尿酸廓清率(Clearance)上升，但肌氨酸(Creatine)廓清率殆無變化。
2. 作用機序：將本劑投與健康成人，以 Penicillin，Phenolsulfonphthalein 之尿中排泄及血中濃度為指標，檢討本劑在近端細尿管作用與結果，本劑對此等藥劑之尿中排泄及血中濃度殆無影響。因此本劑之作用純為阻止近端細尿管尿酸之再吸收。
3. 血中濃度：本劑經口投與健康成人之結果，投與後 2~3 小時達到最高血中濃度，其後半衰期可維持 12~13 小時。

**適應症：**痛風、高尿酸血症。

**用法、用量：**本藥須由醫師處方使用。

通常成人每日 1~3 次，每次 1 錠，經口投與，依年齡症狀適宜增減之。

### 禁忌症：

- (一) 對本藥過敏者。
- (二) 嚴重肝功能不良。
- (三) 嚴重腎功能不良。
- (四) 尿酸性腎臟結石。
- (五) 懷孕及可能懷孕的婦女。

### 警語及注意事項：

在使用本藥前須檢查肝功能，以確認有無肝臟疾病。並應告知病人使用本藥可能有肝臟疾病的副作用，如出現食慾不振、噁心嘔吐、疲倦虛弱、腹痛、下痢、發燒、深色尿液、結膜變黃等症狀，應停藥並立即就醫。

### 注意事項：

1. 急性肝炎等嚴重肝臟不良反應，主要會在開始投藥前六個月內發生，因此最少在最初給藥六個月內，應定期進行肝功能檢查。
2. 在使用期間如有肝臟不良反應之症狀，如：食慾不振，全身倦怠發生時，應立即停止使用本藥品，並到醫療院所就醫檢查。
3. 有肝障害的患者(可引致肝障害惡化)，必須慎重投與本劑。
4. 本劑對急性痛風發作時，暫時不可使用。
5. 本劑具有顯著的血中尿酸降低作用，於投與初期有誘發痛風之可能。

6. 尿呈酸性時，患者可能由尿酸結石產生血尿，易於引起腎痛等症狀，為防止此情況，須增加水分攝取時，尿量增加及尿中鹼性化。因此，如有此情況時，患者需注意酸、鹼平衡。

7. 對於年紀大的患者，因生理機能已減退，宜注意降低用藥量。

8. 對妊婦之投與，因動物實驗之結果，本劑有催畸形作用，對妊婦或可能已妊婦之婦人，不可投與之。

9. 開始投與本藥品前，應先進行肝功能檢查，以確認病人沒有肝功能異常。

10. 長期投與時，應作肝功能定期檢查。

11. 禁忌症(不可投與下列患者)：(1) 肝功能異常者。

(2) 具有腎結石患者，或腎功能有相當程度之障害的患者(可能引致尿中之尿酸排泄量增加，而且藥效可能不會發生)。(3) 孕婦或懷孕的可能性婦人。

12. 腎功能異常之患者，建議酌予減量。

13. 重度肝功能異常之患者應小心使用。

**交互作用：**Coumarin 系列的抗凝血劑(Warfarin)，合併使用本藥時，會增強抗凝血效果，因此 Prothrombin 時間應充分觀察，而且要注意。

### 副作用：

1. 外國有急性肝炎發生之報告，因此須實施肝功能檢查等，而充分觀察，如發現異常時，應停止投藥，採取適切處置。

2. 過敏症：偶有搔癢感、發疹、蕁麻疹、稀有的臉發紅、紅斑，亦有光過敏出現，如有以上症狀發生，請即停藥。

3. 肝臟：時有 GOT、GPT 或偶有 Alkali-phosphatase 值之上升，而引致肝功能的障害，亦有發生黃疸之可能。

4. 消化器官：時有胃部不快感、胃腸障害、下痢、軟便、胸部灼熱，亦可能稀有的發生胃痛、腹痛、噁心、口內破裂等症狀。

5. 其他：稀有浮腫、心窩不快、頭痛的症狀等出現。

**保存條件：**請保存於室溫、陰涼、乾燥及小孩接觸不到之處。

**包裝：**6~1000 錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

**賦形劑：**Starch 1500，Microcrystalline cellulose (Avicel 101)，Lactose，Hydroxypropyl cellulose，Magnesium stearate，Talc



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 ㊦