

"生達"

優喉[®] 溶液 2.5公絲/公撮

Eufan[®] Solution 2.5 mg/ml "Standard"

優喉溶液之主成分為dimemorfan，係一種非麻醉性的中樞性鎮咳劑。Dimemorfan經動物實驗之結果證明比含有嗎啡性質之dextromethorphan或codeine phosphate具有更優異之鎮咳作用，以及顯示其非麻藥性的特色。

成分：每公撮含

Dimemorfan phosphate..... 2.5mg

臨床藥理：1. 鎮咳作用：Dimemorfan phosphate 直接作用於延髓之咳嗽中樞而顯示鎮咳作用，在貓、狗及山撥鼠的藥理實驗中，發揮比codeine phosphate或dextromethorphan更優異的鎮咳效果。

2. 非麻藥性：對於猴子連續投與Dimemorfan phosphate一個月，檢查其身體依賴性及精神依賴性等，經藥物依賴性試驗之結果，證明Dimemorfan phosphate為非麻藥性之藥劑。

3. 腸管內容輸送抑制作用：Dimemorfan phosphate於動物實驗時，未顯示投與codeine時偶而所見之腸管內容物輸送抑制作用(便秘作用)。

藥物動力學：1. 吸收：健康成人男子口服dimemorfan 90mg後，快速吸收，1~2小時可達最高血中濃度0.007~0.008ug/mL。

2. 代謝、排泄：健康男子經禁食12小時後，口服投予dimemorfan 30mg，結果約60%的藥物在24小時內由尿中排除。在尿中檢測出三種代謝產物，未代謝部分≤2%，而代謝物產物無作用活性。

適應症：鎮咳（上氣道炎、急性支氣管炎、肺炎所伴隨之咳嗽）。

用法用量：本藥須由醫師處方使用。

下列一日量分三回經口投與：未滿2歲3.0~4.5ml，2~3歲5.0~8.0ml，4~6歲8.0~11.0ml，7~14歲12.0~14.0ml。依年齡、症狀適宜增減之。

注意事項：1. 下列病患慎重投與：

(1) 糖尿病或疑似糖尿病患(偶有輕微的耐糖能變化)。

(2) 藥物過敏症之患者。

2. 高齡者的投與：一般高齡者之生理機能低下，需注意減量投與。

3. 孕婦的投與：孕婦的安全性尚未確立，所以在治療的有益性大於危險性時方可投與。

4. 液劑調配時應注意：

(1) 本品與Brocincodeine液配合時，會有沉澱析出，故應避免配合。

(2) 本品與Erythromycin Dry Syrup及Josamy Dry Syrup配合則致味苦，但不影響抗生素的力價。

副作用：1. 過敏症：若出現過敏症狀時，請中止投與。

2. 精神神經系統：偶有目眩、欲睡、頭痛、頭重，有時會發現無力感、倦怠感之現象。

3. 消化系統：偶有口渴、食慾不振、噁心、嘔吐、下痢等。

4. 循環系統：有時會頻脈、心悸、顏面潮紅。

貯藏：貯存於乾燥避光之室溫處。(25°C以下)

賦形劑：梅子口味

Sorbitol Solution 70%、Cyclodextrin-Beta、Potassium Sorbate、Sodium Chloride、Sodium Phosphate Monobasic、Sodium Phosphate Dibasic、Sucralose、Sunset Yellow FCF、Plum、Water Purified

包裝：6~4000公撮塑膠瓶裝。

衛署藥製字第044509號 G-7570 Code No.LE-02 2214320



PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司二廠
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區開元路154號