

“信東”倍舒樂 膜衣錠20毫克
Bexolo F.C. Tablets 20mg

【前言】

Bexolo膜衣錠是一種具心臟選擇性的長效Beta-阻斷劑。

【成分】

主成分：每1錠(Tablet)中含有：

Betaxolol hydrochloride 20mg

賦形劑：Lactose (super-tab)、Microcrystalline Cellulose、
Sodium Starch Glycolate、Colloidal Silicon
Dioxide、Magnesium Stearate、HPMC 606、
Polyethylene Glycol、Titanium Dioxide。

【適應症】

動脈性高血壓、穩定性狹心症。

【用法與用量】

本藥須由醫師處方使用。

一般劑量為每天1次，每次20mg。

某些病人之起始劑量為每天10mg。

所有的病例均應遵守醫師之處方。

口服給藥。本錠劑應佐以水整顆吞服，請勿咀嚼。

【使用上之注意事項】

1.一般注意事項

切勿突然中斷給藥。若須停用本藥，請逐漸降低劑量，洽詢您的醫師。

男女運動員必須注意本藥含有活性成分，在執行抗麻藥的測試實驗中會引起陽性反應。

2.禁忌症

請勿於下列病例中使用本藥：

(1) 藥物治療所無法控制的心臟功能不全。

(2) 心臟傳導障礙。

(3) 心跳徐緩(每分鐘少於45~50)。

(4) 嚴重的Prinzmetal's型心絞痛。

(5) 低血壓。

(6) 嚴重的末梢動脈異常，雷諾氏症。

(7) 已知對Betaxolol敏感者。

(8) 服用Floctafenine者。

(9) 相當嚴重的氣喘及阻塞性支氣管—肺疾病。

(10) 未治療的嗜鉻細胞瘤。

若有任何疑問，務必洽詢您的醫師或藥師。

3.副作用

如同其它的活性成分，於某些人中，本藥會引起不同的不適感。

(1) 最常發生的是：易於疲勞、肢體末端的冷感、心跳減低、胃腸不適、性慾異常。

(2) 較罕有的是心臟傳導減低、心臟功能不全、血壓驟降、支氣管痙攣、低血糖、雷諾氏症、皮疹。

於服藥過程中發生任何異常的反應時，皆須向醫師報告。

4. 交互作用

當服用超過一種藥物時，為避免產生可能的交互作用，您必須例行地向您的醫師報告您所服用的其它藥物。

禁止併用：Floctafenine

不建議併用：Amiodarone

小心併用：揮發性的鹼素麻醉劑、鈣離子拮抗劑、抗心律不整劑、Baclofen、Clonidine、Insulin及降血糖的Sulphonamides類製劑、Lidocaine、含碘的顯影劑、局部的胃腸製劑、非類固醇類抗發炎劑、Imipramine-based的抗抑鬱劑、皮質類固醇、Tetracosactrin、Mefloquine。

5. 配伍禁忌

目前尚未知。

6. 應用時之注意事項

欲停用本藥時，劑量之減低必須在一星期以上至二星期。必要時，可同時開始替代療法。

本藥應小心使用於

(1) 輕度氣喘及慢性阻塞性支氣管一肺疾病。

當於服藥期間發病時，應當給予擬Beta-交感神經接受器作用型支氣管擴張劑。

(2) 控制中的心臟功能不全，非重度之心跳徐緩(每分鐘超過50次)，非重度之心臟傳導障礙，較輕的Prinzmetals型心絞痛，較輕的末梢心血管異常，治療中的嗜鉻細胞瘤，牛皮癬，過敏病史。

(3) 老年人、腎功能不全、糖尿病。

(4) 當手術時，應通知麻醉醫師，該名患者正在服用Bexolo膜衣錠。

(5) 當懷孕及哺乳時應通知醫師(在服藥期間不建議哺乳)。
若有任何疑問，請立即洽詢您的醫師或藥師。將藥品置於小兒無法觸及之地方。

7. 交付藥劑時

本藥係依據您個人的特殊狀況而處方的

(1) 本藥並不適用於另一病例。

(2) 除了醫師的建議之外，請勿重複使用。

(3) 請勿將本藥介紹給他人。

【保管上注意事項】

貯存時，請避熱及潮濕。

請勿超過包裝上的保存期限。

【包裝】

2~1,000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第044619號G-7607



信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路22號

54020370⑤