15cm

暈得寧 防暈貼片劑 1.5 毫克 (東莨菪鹼) Ariel TDDS 1.5mg (scopolamine)

【性狀】

本品為一面積為3cm²之圓形經皮吸收貼片劑(Transdermal Drug Delivery System)，使用時貼於耳後皮膚。其主成份以三天內釋出 1.0 mg 的速率持續釋出，經皮膚吸收，進入血液，以達到鎮暈止吐之藥效。

【成份】

有效成分及含量：每片含1.5 mg東莨菪鹼(scopolamine)。

其他成分(賦形劑)：Acrylic copolymer pressure sensitive adhesive。

【用途(適應症)】

預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

【使用上注意事項】

一. 有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。

二. 有下列情形者，請洽醫師診治：

- 12歲以下。
- 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
- 曾診斷有下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎臟病。
- 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難；及青光眼的人，因前列腺腫大引起排尿困難的人。
- 有深部皮膚組織感染。

三. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 65歲以上。
- 接受醫師治療並服用藥品的人。
- 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 服用其他鎮暈藥、綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
- 服用本藥若有不了解之處。

四. 其他使用上注意事項：

- 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
- 避免陽光直射。
- 勿超過建議使用量或使用次數。
- 不得與酒精性飲料併用。
- 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- 所貼部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

21cm

8. 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。
9. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
10. 本藥使用兩次之間須至少間隔72小時。

【用法用量】

年齡	用法用量
成人及 12歲以上	1.本藥應於搭乘飛機、汽車、船之前5~6小時(至少4小時)使用，並於旅途結束後除去。 2.使用時先由切口處撕開鋁箔袋包裝，取出貼片，撕去透明塑膠護膜(請勿觸碰貼片的銀色內面)將銀色內面貼於耳後無毛髮且已洗淨擦乾的完整皮膚表面。(如圖一) 3.每次使用一片，每片藥效可維持72小時。超過72小時的長途旅行，可在72小時後撕去舊的貼片，在另一耳朵後方貼上一片新的貼片。
12歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

部位	副作用。
神經系統	思睡、倦怠感；興奮(幼兒及老年人較常見)。
皮膚	發疹、發紅、癢疹。
其他	頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢、視覺上之困擾。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】

1-1000片鋁箔袋盒裝

製造商：華健醫藥生技股份有限公司(湖口廠)

地址：新竹縣湖口鄉鳳山村工業五路3號

諮詢電話：03-696-0011

衛署藥製字第044712號

※本品已取得美國專利字號 5,962,012 並榮獲經濟部第七屆創新研究獎，2001年國家生技醫療品質獎入圍及90年科學工業園區優良廠商創新產品獎。