

綜合感冒劑

# 熱必解感冒液

Re Bi Jie Cold Liquid

〔成份〕： Each ml contains：

ACETAMINOPHEN .....	10mg
CHLORPHENIRAMINE MALEATE.....	0.1mg
DL-METHYLEPHEDRINE HYDROCHLORIDE .....	0.5mg
POTASSIUM GUAIACOLSULFONATE.....	2.5mg
CAFFEINE ANHYDROUS.....	1.25mg

【賦形劑】：

Polyethylene Glycol 4000 (PEG 4000)，High Fructose Syrup，Citric Acid，Sodium Benzoate，Sodium Saccharine，Edetate Disodium (EDTA)，Essence of Cider，Caramel，Purified Water

〔適應症〕：

緩解感冒之各種症狀（流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、咯痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛。）

〔用法用量〕：

一日4次。成人每次10ml，12歲以上適用成人劑量。  
醫師藥師藥劑生指示藥品。

〔副作用〕：

1. Chlorpheniramine Maleate：嗜睡、口乾、倦怠感、視覺模糊、錯亂、小便困難、心跳加快。
2. Caffeine：神經質、興奮、睡不著與心搏加快。

〔注意事項〕：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：  
(一)孕婦及授乳婦不建議自行使用。  
(二)服用本藥時不得併服其他藥品。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 不得併服含酒精飲料。

〔警語〕：


1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：  
(一)12歲以下不建議自行使用。  
(二)曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
3. 患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳化痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
5. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
6. 吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
7. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
8. 不要服用本藥超過七日。
9. 服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
10. 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
11. 肝毒性：  
(一)使用 acetaminophen(paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部分發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4000毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。  
(二)病人應注意藥品的標示中是否含有 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過4000毫克的 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
12. 不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險。
13. 過量：  
(一)服用過量 acetaminophen 會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。  
(二)本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。  
(三)Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心、嘔吐、出汗和全身不適。肝毒性的臨床證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。
14. 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、瘙癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。如果有發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。
15. 嚴重皮膚反應：使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿疱病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。
16. 本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：  
(一)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。  
(二)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
17. 本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。
18. 本藥含咖啡因類成分，應注意下列事項：  
(一)應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

(二)為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【包裝】：10~4000 毫升玻璃瓶裝 衛署藥製字第 044808 號  
【儲存條件】：室溫(15~30°C)避光儲存。 PIC/S GMP 優良藥廠

製造廠：澳斯麗國際股份有限公司 淡水廠 地 址：新北市淡水區北新路三段 123-1 號

經銷商：救人實業股份有限公司 地 址：台北市萬華區洛陽街 9 號 9 樓之 1

PIC/S GMP 優良藥品 衛署藥製字第 044808 號	綜合感冒劑 60ml <b>熱必解</b> 感冒液 <i>Re Bi Jie Cold Liquid</i>
	【成分】 Each ml contains : ACETAMINOPHEN .....10mg CHLORPHENIRAMINE MALEATE.....0.1mg DL-METHYLEPHEDRINE HYDROCHLORIDE ...0.5mg POTASSIUM GUAIACOLSULFONATE.....2.5mg CAFFEINE ANHYDROUS.....1.25mg 【效能】 緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、 咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛） 【用法用量】 一日四次，飯後服用，成人每次量 10ml，12 歲以上 適用成人劑量。
	請詳閱說明書後使用 醫師藥師藥劑生指示藥品 製造批號： 製造者：澳斯麗國際股份有限公司 有效期限： 淡水廠 地 址：新北市淡水區北新路三段 123 之 1 號 經銷商：救人實業股份有限公司 地 址：台北市萬華區洛陽街 9 號 9 樓之 1