



平滑肌鬆弛劑

DET-007
衛署藥製字第045247號

肚比康® Dobecon®

糖衣錠 100毫克

Sugar Coated Tablets 100mg

3.98cm

【成 分】 每錠中含：

Mebeverine hydrochloride.....100mg

【賦 形 劑】Microcrystalline Cellulose、Polyvinyl Pyrrolidone、Colloidal Silicon Dioxide、Magnesium Stearate、Lactose、Hydroxypropylmethylcellulose、Sucrose、Acacia、Gelatin、Calcium Phosphate Dibasic 2H₂O、Titanium Dioxide、Talc。**【作 用】**

解痙攣(Antispasmodic agent)。

【適 應 症】

原發性續發性結腸過敏合併症、腸憩室炎、腸憩室形成及區域性腸炎、膽胰運動困難、胃潰瘍、消化器官炎等症。

說明

結腸痙攣所產生官能性疾患：

1. 原發性腸激燥症候群(Irritable Bowel Syndrome)
2. 伴有腸胃道器官損傷之結腸激燥症候群，如結腸憩室症、憩室炎、局部性腸炎、膽囊或膽管疾病、胃與十二指腸潰瘍、下痢及消化道特殊的或非特殊的發炎現象。

【劑 量】

每次100mg，每日3~4次，宜飯前20分鐘服用。治癒後宜在數週內逐漸減量，不可遽然停藥。

本藥須由醫師處方使用。

【過 量】

理論上，過量時可能發生中樞神經興奮之現象。已知無特定的解毒劑。

【過量時之處置】

建議洗胃(gastric lavage)及症狀治療。

【禁 忌 症】

對此產品的任何成分過敏者不宜使用。

【警 告】 無。**【對駕駛或操作機械之影響】**

Mebeverine曾經被報導偶而會導致頭暈，所以可能會影響駕駛及操作機器之神經運動性技能。

【懷孕及授乳】

目前有關動物實驗中尚未發現有致畸形胎兒現象。然而，如同服用一般藥物，懷孕期間服用本藥依然需小心謹慎。Mebeverine於治療劑量下不會排泄於授乳婦之乳汁中。

【副 作 用】

非常少的案例曾被報導有過敏反應發生，特別是紅疹或蕁麻疹。

【交互作用】 無。**【不相容性】** 無。**【藥 理 學】** 依文獻記載

Mebeverine是一種向肌性解痙攣劑(musculotropic antispasmodic)，可直接作用於胃腸道平滑肌，解除痙攣而不會影響正常的腸道蠕動。因為並非藉由自主神經系統來作用，故不會有一般之抗膽鹼性(anticholinergic)副作用出現。Mebeverine適用於攝護腺肥大(prostatic hypertrophy)患者及青光眼(glaucoma)患者。

【藥物動力學】 依文獻記載

Mebeverine口服後，快速且被完全地吸收，Mebeverine不以原型排泄但代謝完全，代謝的第一步驟是水解(hydrolysis)，產生veratric acid及Mebeverine alcohol。Veratric acid及Mebeverine alcohol都排泄於尿液中，部份代謝成carboxylic acid與demethylated carboxylic acid。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 室溫25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包 裝】

6~1000錠PTP鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2151553