

肌得樂錠 4公絲

Spaslax Tablets 4mg

成 分： 每錠含 Tizanidine 4mg (Tizanidine hydrochloride 4.58mg)

特 性： 本錠劑是一種中樞作用性骨骼肌鬆弛劑，主要作用位置在脊髓，能選擇性抑制負責肌肉過度張力的多突觸機轉，主要在於減少中間神經單位興奮性胺基酸的釋出。本品不影響神經肌肉的傳導。本錠劑耐受性良好，能有效對抗急性疼痛性肌肉痙攣及慢性脊髓及大腦源起的痙攣狀態，減少被動運動時的抵抗力，緩解痙攣及陣攣並增強隨意肌的力量。

藥物動力學： 本錠劑能迅速而且幾乎完全被吸收，在 1~2 小時內達到顛峰血清濃度。大部份在肝臟代謝，代謝物相當不具活性。原型藥與其代謝物主要由腎臟排出 (近 70%)，以 3~5 小時之半衰期排出體外。血漿蛋白結合力低 (30%)。

適 應 症： 神經疾患所引起的痙攣症狀，疼痛性肌肉痙攣。

用法用量： 神經疾患所引起的痙攣症狀：劑量依病人個別的需求調整，開始時每日劑量不可超過 6 mg，分三次投予，每半週或一週漸次增加 2~4 mg，通常在每日劑量 12~24 mg，投予 3 或 4 次同樣的間隔劑量時發生最理想的治療反應。每日最大建議劑量為 36 mg。

禁 忌： 仍未有已知的禁忌。

注意事項： 腎臟或肝臟功能受損的病人必需調整其劑量。開始治療時，病人會有思睡的現象，應告知不要進行需高度警覺性的活動，比如開車或操作機械。

本品對動物沒有致畸作用，但是懷孕期的安全性仍未確立。

兒童使用本品的經驗仍有限，對吃母乳的嬰兒，其安全性仍未知，與所有的藥物一樣，本品應置於孩童無法拿到的地方。

交互作用： 本品與抗高血壓劑包括利尿劑併用，有時會引起低血壓及心博徐緩。鎮靜劑包括酒精，可能會增強本品的鎮靜作用。

副作用： 依緩解疼痛性肌肉痙攣建議的低劑量，罕有副作用而且通常輕微且是暫時性的。副作用包括思睡、疲勞、頭暈、口乾、噁心及輕微的血壓下降。依痙攣狀態建議的較高劑量，上述副作用較常見也較顯著。但是很少嚴重到需要停止治療。除此之外，可能發生肌肉虛弱及失眠。曾觀察到低血壓及心博徐緩的例子。少數病人曾暫時性升高血清中的 **transaminases**。

過量使用： 截至目前為止，只有一個成人病例服用 **400 mg** 本品，病人康復的情形十分良好。

症狀：噁心、嘔吐、低血壓、頭暈、瞳孔縮小、呼吸困難、昏迷。

治療：洗胃排除藥物後，再投予活性碳及強迫性利尿。

症狀治療：包括心臟血管及呼吸系統的支持性療法，仍未有專一性解毒劑。

賦形劑： Microcrystalline Cellulose、Lactose、Stearic Acid、Silicon Dioxide。

儲存： 於 25°C 以下儲存。

包裝： 3~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 045439 號 GMP G-7899

本藥須由醫師處方使用

藥 商：寶齡富錦生技股份有限公司

地 址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製 造 廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠 址：桃園市平鎮區興隆路 266 號