

# 泌樂斯®膜衣錠 50 毫克

## Glibos® F.C.Tablets 50 mg

網號：C73

**成分名：**Acarbose

**劑型、含量：**Each Tablet contains: Acarbose...50 mg

**特性：**本藥的主成分為 acarbose，是一種由微生物質萃取而得的偽四多醣(pseudotetrasaccharide)。本藥主要在腸道發揮它的作用；其作用機轉主要是抑制腸道內負責分解雙醣、寡醣及多醣的酵素-- $\alpha$ -glucosidase，而此種的作用機轉，可依據給藥劑量，延遲碳水化合物化合物的分解。最重要的是，能延緩碳水化合物分解成葡萄糖進入全身循環。

本藥藉由上述作用機轉，可延遲並減少飯後血糖升高，進而平衡經腸道對葡萄糖利用，而維持一天內平穩的血糖濃度，並且減少平均血糖值。

**適應症：**非胰島素依賴型糖尿病之治療。

**用法、用量：**\* 本藥須由醫師處方使用。

由於本藥的療效及耐受性因人而異，其劑量應配合個別病人由醫師給予，除非醫師另有指示，其建議劑量如下：初期：一天三次，每次一錠。

後繼：一天三次，每次二錠。

有時需要最高劑量可一天三次 200 公絲的 acarbose。服藥 4~8 週後或病人在後繼治療後無法呈現適當的臨床反應，才能考慮增加劑量。病人雖嚴格遵守糖尿病飲食原則但不適症狀發生，則不宜再增加劑量，必要時應酌予降低。平均劑量為日劑量 acarbose 300 公絲，相當於本藥 50 公絲二錠，每天三次。

**服藥方法：**

本藥必須在用餐前，以少量液體，整顆吞服，或用餐時與前數口食物一起咬碎吞下。並無預見本藥的治療期長短需限制。

老年人(65 歲以上)：並無建議此類病人須改變劑量或用藥頻率。 孩童：見“禁忌症”。

肝功能損害病患：在已有肝功能損害之病患無需調整劑量。

腎功能損害病患：見“禁忌症”。

**禁忌：**

1. 對 acarbose 或本藥賦型劑成分過敏者。
2. 本藥對孩童及青少年的藥效及耐受性的資料不足，本藥不可使用於年齡小於 18 歲者。
3. 慢性腸胃道不適，伴隨明顯消化、吸收障礙者。
4. 服用本藥，腸內氣體會增多，而惡化 Roemheld's 症、重度疝氣、腸阻塞、腸潰瘍者的病情。
5. 因尚無懷孕婦女服用本藥的研究報告，懷孕婦女不可服用本藥。
6. 授乳老鼠，服用標的放射性 acarbose 後，發現有少量放射性存在乳汁中；在人類尚無同樣的發現，但仍不排除 acarbose 經由母乳對嬰兒之作用，原則上建議醫師不處方本藥給哺乳婦女。
7. 本藥不可使用於嚴重腎功能不全的病患 (creatinine clearance < 25ml/min)。

**警語及注意事項：**

少數個案，可能發生無徵狀的肝酵素(liver enzyme)上升，因此在治療初期 6~12 個月應考慮適時測定肝酵素。經過評估，這些變化在停藥後可恢復正常。

**交互作用：**

使用本藥的治療期間，食用蔗糖及含蔗糖食物時，由於結腸內碳水化合物的發酵作用增加，常引起腹部不適甚或腹瀉。本藥具有降血糖的作用但本身不會導致

低血糖症。本藥和其他糖尿病治療劑如 sulphonylureas、metformin 或 insulin 合用而使血糖值降低到血糖過低範圍時，必須適量降低 sulphonylureas、metformin 或 insulin 的使用劑量。個案可能發生低血糖休克。如果急性低血糖症發生時，必須留意到服用本藥會使蔗糖分解成果糖及葡萄糖的速度更緩慢，因此使用蔗糖並不適用於解除低血糖症，必須使用葡萄糖。在個案中本藥可能會影響到 digoxin 的生體可用率，而可能須調整 digoxin 劑量。由於本藥和 cholestyramine、腸吸附劑(intestinal absorbents)及消化酵素製劑(Digestal enzyme products)合用時，可能會影響本藥的作用，必須避免同時服用。並無觀察到與 dimethicone/simethicone 合用有交互作用產生。

**副作用：**

一般為胃腸脹氣、腹瀉、腹痛。少見噁心。病患飲食不加節制，則有可能加重腸道的副作用。雖然遵守糖尿病飲食處方，但仍發生嚴重不適時，宜請教醫師，暫時或永久減低劑量。非常少數個案可能發生皮膚過敏反應，例如：皮疹、紅斑、病疹、蕁麻疹。非常少數個案有水腫現象。非常少數個案發生下腸阻塞或腸阻塞。曾有報告指出非常少數個案有黃膽及/或肝炎及相關肝損壞的情形發生。病人每天服用建議劑量 150~300 公絲的 acarbose，很少觀察到有臨床相關的不正常肝功能測試結果 (超過正常值上限的三倍)。(請同時參考警語及注意事項)。

**服藥過量：**

當本藥與含有碳水化合物(雙醣，寡醣及多醣類)的飲料或食物一起食用時，過量會造成脹氣、腹脹及腹瀉。在不是與食物併用而本藥過量的情形下，並不預期有過多的腸症狀出現。過量的病人在四至六小時內，不可給予含有碳水化合物(雙醣，寡醣及多醣類)的飲食。

**建議：**

服用本藥時仍必須嚴格遵守糖尿病飲食。不可未與醫師商量即自行停用，此舉可能導致血糖上升。病人執行糖尿病飲食療法時，單獨服用本藥不致引起低血糖症。使用本藥時，由於人體 insulin 的需要降低，應減少 insulin、sulphonylureas、metformin 的治療量，而發生低血糖時，必須使用葡萄糖而非蔗糖。糖尿病識別卡須註明服用本藥。

**保存條件：**請保存於 30°C 以下緊密封裝中及小孩接觸不到之處；本藥品開封後應儘快使用，避免受潮。

**包裝：**6~1000 錠，塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

**賦形劑：**

Microcrystalline cellulose (Avicel 101)  
Starch 1500  
Silicon dioxide (Adsolider 101)  
Magnesium stearate  
HPMC 6 cps  
HPMC (Pharmacoat 603)  
PEG 6000  
Titanium dioxide



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 ©