

【成份】Each gm contains:

Mometasone furoate 1 mg

【作用】Mometasone furoate 為一種合成的類固醇，具有抗發炎、止癢及血管收縮等特性。

【適應症】對類固醇具有感受性之皮膚病所引起之炎性反應及搔癢之緩解。

【用法用量】一日一次，薄敷於患處，直到患處痊癒，最久可持續敷藥至三星期為止。本藥須由醫師處方使用。

【副作用】感覺異常，癢或皮膚萎縮，但極少發生。

使用其他局部類固醇製劑可能會有的局部副作用：刺激性、多毛症、色素沈著不全、口周皮膚炎、過敏性接觸皮膚炎、皮膚浸軟、二次感染、皺摺及汗疹。

【禁忌症】禁用於對本劑中之任一成份或其它類固醇過敏之病人。

【注意事項】如有刺激、過敏發生、應停用本劑，並施予適當治療。如患處有明顯的感染發生、應予適當抗生素和抗微生物治療，如果情況未見好轉，則應停用本劑，直至感染被控制住方可再用。其化如全身性類固醇易引起的副作用偶爾也會發生，如腎上腺抑制。廣體、密閉式治療容易引起全身性吸收。所以在長期使用本劑時，尤其嬰幼兒，需特別小心。本劑不可作為眼用。大面積，密閉式治療容易增加全身性吸收。所以在大面積或長期使用本劑時，尤其嬰幼兒，需特別小心。

兒童使用局部類固醇較成人病患更易導致下視丘—腦下垂體—腎上腺軸功能抑制及Cushing's syndrome，因為體表面積 / 體重的比例較大。兒童局部使用類固醇必須將劑量限制在可達有效治療的最低使用量，長期的類固醇治療可能會干擾兒童的生長發育。

【懷孕或哺乳婦女】

對胎兒及哺乳婦女安全性未知，因此在對母體的有益性大於對胎兒的危險性時才可使用，請務必小心，不得大量或長期使用。

局部使用類固醇而全身性吸收，尚不知是否會分泌在乳汁中，全身性的使用類固醇會分泌於乳汁中，要評估此藥對母親的重要性，再決定停止哺乳或停藥。

【過量】出現症狀：過量長期使用會抑制下視丘—腦下垂體功能，引起腎上腺功能抑制。

治療方法：可給予適當的症狀療法。急性皮質類固醇過多乃可逆反應。如有需要，可作適當處理來治療電解質不平衡。如果為慢性中毒，以漸進式中止類固醇治療。

【賦形劑】Tefose 63、Myristyl myristate、Eutanol G、Octyldodecyl myristate、Propylparaben、Aloe、Methylparaben、Dimethicone (DC 200/100)、Water purified。

【儲存條件】儲存於25°C以下。

【包裝】1000公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。



元宙化學製藥股份有限公司
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD

南投市南崗工業區南崗三路272號
TEL : (049) 2253190