十全藥品

衛署藥製字第045921號
G-8138號

"十全"善鐵咀嚼錠

Ferrosan Tablets "S.C."

【成份】Each tablet contains:
Iron(III)(hydroxide Polymaltose complex).....100mg

【作用】本品特別用來治療鐵質缺乏症，本品含有100mg之鐵質，一天一次給藥，況且本品之鐵係以非離子性的Iron Hydroxide polymaltose complex之形式給予，所以服用本品將不會引起一般離子性鐵鹽常見的副作用，如胃腸障礙、牙齒變色、金屬味及與其他食物或藥物之相互作用。本品除了本身有良好的耐受性外，還有很高的安全性，存在於本品中的鐵，口服毒性很低，因此意外過度服用所造成的鐵中毒相當罕見。本品經各種身體可用率實驗及臨床比較，証實鐵之吸收利用與亞鐵鹽完全相同。

【適應症】預防及治療鐵質缺乏症、缺鐵性貧血症。

【用法用量】每天一錠，任何時間服用均可，如果需要，劑量可增加為一天服用二次，每次一錠。為能補充體內鐵質之庫存，在血值(Hb, Ht, 紅血球)正常後，最好再繼續服用一個月。本藥須由醫師處方使用。

【治療持續時間】Hb值為90g/L或以上時的劑量是每天1錠(100mg)

體重 (kg)	治療持續時間(週)					
	Hb60g/L	Hb75g/L	Hb90g/L	Hb105g/L	Hb120g/L	Hb135g/L
35	7	6	7	6	5	4
40	8	7	8	7	6	5
45	9	7	8	7	6	5
50	9	8	9	7	6	5
55	10	9	9	8	6	5
60	11	9	10	8	7	5
65	12	10	10	9	7	5
70	12	11	11	9	7	5
75	13	11	11	9	7	6
80	14	12	12	10	8	6
85	15	13	12	10	8	6
90	15	13	13	11	8	6

【禁忌症】人體中，鐵質過分負荷者及鐵質利用障礙者。

【相關禁忌症】如果是傳染性或腫瘤性鐵質不足之貧血症，鐵質將會儲存在RSE中，鐵質之代謝及利用將不會發生效用，除非原發性疾病完全痊癒。

【注意事項】服用本品後，糞便將呈暗黑色，此是以鐵質治療所產生的，沒有關係。

【警語】本品和阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

【賦形劑】：Lactose, Mannitol, Microcrystalline Cellulose, Plasdone, Silicon Dioxide, Magnesium stearate, Talc, Aspartame, Milk Powder, Chocolate Powder

【包裝】：2~1000錠塑膠瓶裝與鋁箔盒裝。儲存於25℃以下。

十全實業股份有限公司
南投縣南投市南崗工業區仁和路27號

電　　話：(049)2254221-3
服務專線：(049)2254615
訂購專線：0800-491666
傳　　真：(049)2254617