



永康敏[®] 內服液

Alltec Oral Solution (0.1%)

【成份】

Each ml contains :

Cetirizine dihydrochloride.....1.00mg

【賦形劑】

Methyl Paraben、Propyl Paraben、Sorbitol Solution 70%、Sugar、Sodium Acetate、Banana Essence、Purified Water Add To

【特性】

Cetirizine 為 ANTI-H1 之抗過敏治療劑，且無明顯的 Anti-Cholinergic 及 Anti-Serotonin 作用。

在有效劑量內 Cetirizine 不會通過腦血管障壁，對中樞神經沒有作用，不會產生安眠及行為異常等現象。

【Cetirizine 作用】

1. 迅速抑制外生性組織胺。
2. 對內生性組織胺的釋出有抑制作用（如 48/80 之組織胺）
3. 抑制由 VIP（Vasoactive Intestinal Polypeptide）和 Substance P 所引起之過敏反應。
4. 抑制初期皮膚過敏反應時，組織胺介質的作用。
5. 明顯抑制發炎性細胞（例如 eosinophils）的移動，降低遲發性皮膚過敏反應的介質釋放。
6. 顯著的降低氣喘患者的支氣管對組織胺的過度反應。
7. 降低由特殊過敏原引起的過敏反應。

這些作用，由心智測驗及 Quantified EEG 得知，對中樞神經不會產生任何作用。

【藥物動力學】

口服 Cetirizine 1 小時內，會達血中最高濃度。

血漿半衰期成人約為 10 小時，6-12 歲的孩童約為 6 小時，3-6 歲的孩童約為 5 小時。

成人及孩童的蓄積腎排泄量（cumulative urinary excretion）約為投藥量的三分之二。

通常孩童的血漿清除率要比成人為高。

Cetirizine 的吸收並無個體差異。

體內血漿濃度與投藥量成線性關係。
Cetirizine 與血漿蛋白具有很強的結合能力。

【適應症】

季節性鼻炎，結膜炎，過敏性鼻炎，蕁麻疹，過敏性搔癢等過敏現象。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人及 3 歲以上孩童適用。

成人及 6 歲以上孩童：每次 10 毫升，一天一次，於晚餐時與液體伴服用。

3-6 歲孩童：一天一次，每次 5 毫升於晚餐時服用。或分別於早、晚各服用 2.5 毫升。

腎功能不全的患者服用本藥時，其劑量應減半。

【禁忌症】

對本藥中任何成分有過敏者。

【副作用】

曾有報導顯示會發生輕微、短暫的主觀性副作用，例如：頭痛、眩暈、嗜眠、精神激昂、口乾、胃腸道不適。但由精神運動性（psychomotor）的客觀性功能試驗結果來看，Cetirizine 的鎮靜作用發生率與安慰劑的效果相似。Cetirizine 的過敏性徵狀極少被報導。

【孕婦及授乳婦】

動物實驗中，尚無引起不良反應之報告。但孕婦應避免使用本藥。Cetirizine 會被排泄至乳汁中，因此授乳婦不可使用本藥。

【藥物交互作用】

至今尚未有藥物交互作用方面的報告，但若同時服用鎮靜劑者，請謹慎使用。本藥應避免與過量的酒精併服。

【注意事項】

1. 在治療劑量下，Cetirizine 不會加重酒精（血中酒精濃度為 0.8g/L 時）的作用，但應避免。
2. 實驗證明，對正常人投予每天 20~25 毫克的劑量，不會影響警覺及反應時間，但從事駕駛及操作機械者，請小心使用，儘量不要過量服用。

【過量】

單次劑量超過 50 毫克時，會有安眠的症狀發生，無特殊之解

毒劑。因此如有此現象發生，請儘快以灌腸法及一般急救法處理。

【貯 存】

請存放在室溫 25°C 以下乾燥處。

【安 定 性】

請注意包裝上所標示的有效期限。

【包 裝】

10~4000 公撮玻璃瓶裝，塑膠瓶裝。

(依文獻刊載)

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號