〝晟德〞

# 適咳液

## Sheco Solution 〝Center〞

GMP
衛署藥製字第 046442 號
G-8359

主 成 分：每毫升(ml)含有
Codeine Phosphate ……..……0.60 mg
Glycyrrhiza Powder……25 mg

適 應 症：
鎮咳、祛痰(感冒、支氣管炎及呼吸器疾患所引起之咳嗽、喀痰)。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
一日服用四次
成人：每次 16 毫升
6-12 歲孩童：每次 8~16 毫升
2-6 歲孩童：每次 4~8 毫升
本品用於兒童，僅限臨床效益大於風險時使用。

藥理作用：
本品可直接抑制延腦的咳嗽中樞，以抑制咳嗽反射作用。

**禁 忌：**
**兒童扁桃腺及腺樣體切除術後止痛、已知 CYP2D6 快速藥物代謝者(ultra-rapid metabolisers)及哺乳婦女。**

**注意事項：**
1. **警告病人勿超過建議劑量使用，因為超量使用時，鎮咳作用不會明顯的加強，但是不良反應和成癮的危險性增加。**
2. **下列病人使用本品宜小心：氣喘或其他肺疾，心臟疾病(包括心律不整)，驚厥的疾病腎臟或肝臟受損，前列腺肥大，嚴重的 CNS 抑制作用，毒性精神病，頭部受傷，顱內病灶，甲狀腺機能不足，愛迪生症狀；此外，還有酒精中毒和懷孕的婦女也要小心使用。**
3. **若有副作用產生，應立即停藥就醫。**

**副 作 用：**
**(過量時經常發生) 頭重腳輕、眩暈、鎮靜、發汗、噁心。**

**警 語：**
1. **長期使用易致成癮。**
2. **已知或疑似麻醉藥成癮的人。**
3. **早產兒、1 歲以下嬰兒及 1-2 歲幼兒，不建議使用。**
4. **2-12 歲兒童，依年齡減量使用。**
5. **肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。**

賦 形 劑：Caramel (Sugar Burnt), Benzoic Acid, Antimony Potassium Tartrate, Glycerin, Alcohol, Ethyl Nitrite Spirits, Anise oil, Water Purified

包 裝：32~4000 毫升塑膠瓶裝

儲 存：
(1)本品應置於兒童不及之處。
(2)請密封儲存於 25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)
CENTER LABORATORIES INC.
地 址： 臺北市南港區園區街 3 之 2 號 7 樓
晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)
廠 址： 新竹縣湖口鄉實踐路 2 號
公司電話： (02) 2655-8680 圖文傳真： (02)2655-8380
工廠電話： (03) 598-1829 圖文傳真： (03) 598-1820
CTRA-044 20150728