"立康" 敷炎痛貼布 (氟白普洛芬)
FLUAN PATCH "LI KANG" (FLURBIPROFEN)

【主成分】Formula
每片中含有：
Each patch 12g (10.5cm x 14.0cm) contains：
Flurbiprofen 40.0mg

【適應症】
變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、筋肉痛、外傷之腫脹、疼痛等諸症狀的鎮痛、消炎。
Application：
Deformans arthritis、Periarthritis of the shoulder、Tenontitis、Tenosynovitis、Peritenonitis、Carpitis、Muscle pains such as Bruises, Sprains, and Strains.

【用法用量】患部清洗乾淨，每日貼二片。(本藥須由醫師處方使用)
Usage & Dosage：
After clean, two pieces a day.

【賦形劑】
Alcohol、Gelatin、Glycerin、Kaolin、Menthol、Polyacrylic acid solution、Polyoxyethylene stearate、Purified water、PVA solution (Methyl Paraben、Polyvinyl Alcohol、Propyl Glycol、Propyl Paraben、Purified Water)、Sodium hydroxide、Sodium polyacrylate、Titanium dioxide.

【注意事項】
1. 禁忌：
   a.對本劑或其他之 Flurbiprofen 製劑，曾有過敏之患者。
   b.曾有 Aspirin 喘息，或曾對非類固醇性消炎鎮痛劑會產生誘發性喘息發作之患者。
2. 重要的基本注意事項：
   a.以消炎鎮痛劑來治療時，不是原因療法，而只是對症療法時，須留意。
   b.由於對皮膚之感染症，無抗菌效果，因此對於伴有感染之炎症，使用時要併用抗菌劑或抗真菌劑，而且要十分慎重投藥及觀察。
   c.對於慢性疾患(如變形性關節症等)之治療應考慮使用藥物療法以外之療法，而且又要仔細觀察患者之狀態，留意副作用之產生。
3. 慎重投藥：
   有支氣管喘息之患者〔支氣管喘息患者之中，對 Aspirin 會誘發喘息發作之患者〕
4. 副作用：
   較嚴重之副作用—會誘發喘息發作(Aspirin 喘息)，由於會誘發喘息之發作(發作原因不明)，因此發現有乾性 La 音，喘鳴，呼吸困難感等之初期症狀時，須停止用藥。本劑貼後數小時曾有發現誘發喘息發作之情形。

副作用之頻度	0.1~5%未滿	0.1%未滿
皮膚	搔癢、發赤、發疹	斑疹、刺痛熱辣感

5. 對高齡者之使用：
   對高齡者所貼付部位之皮膚狀態要加以注意，須慎重使用。
6. 對孕婦、產婦、哺乳中之婦女等之使用：
   孕婦或可能懷孕之婦人，判斷使用上之有益性大於危險性之情況下才投藥。對於孕婦要確定其安全性無慮時才投藥。
7. 小兒等之使用：
   對於小兒要確定安全性無慮時才使用。
8. 使用上之注意事項：
   a.勿使用於損傷皮膚，及勿貼於黏膜上。
   b.勿使用於濕疹或發疹之部位。
   c.擦去汗水後使用。
9. 25℃以下遮光保存。

【許可證字號】 衛署藥製字第 G-8375 046459 號
【包裝】 500 片以下塑膠袋盒裝、鋁箔袋盒裝

製造廠：
立康生物科技股份有限公司工廠
LI KANG BIOTECHNICAL CO., LTD.
台灣台南市永康區王行里環工路29號
No.29, Huangong Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71041, Taiwan (R.O.C)

總經銷：
生達化學製藥股份有限公司
台南市新營區土庫里土庫6之20號
TEL：06-636-1516