

# 銀暢

膜衣錠

## Ginkgoxin

Film Coated Tablets

請您詳細閱讀此說明書，此說明書提供您重要的資訊，請小心正確地服用以得到最好的療效；並請保留此說明書，需要時可再重新閱讀。

**【成分】**

有效成分及含量：每錠中含：Ginkgo Biloba Extract.....40mg  
(eq. to 9.6mg Ginkgoflavonglycosides Calculated as Quercetin, Kaempferol and Isorhamnetin.)

其他成分（賦形劑）：Lactose、Hydroxypropyl Cellulose、Magnesium Stearate、Talc、Crospovidone XL、Hydroxypropylmethyl Cellulose、Polyethylene Glycol 6000、Titanium Dioxide、Tartrazine、Brilliant Blue FCF。

**【用途（適應症）】**

末梢血行障礙之輔助治療。

**【使用上注意事項】**

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  1. 懷孕及哺乳婦。
  2. 近期將進行手術：因可能增加手術出血之風險。
  3. 曾因本藥成分引起過敏的人。
  4. 12歲以下。
  5. 月經期間。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 癲癇病人：建議避免使用本藥，因本藥可能會誘發癲癇的發作。
  2. 正在使用抗凝血劑、抗血小板藥品、非類固醇類抗發炎止痛劑：可能因藥物交互作用而發生不良反應之風險。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  1. 正在使用任何藥品，包括不是經醫師處方之藥品。
  2. 可能懷孕婦女。
- 四、其他使用上注意事項：
  1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  2. 避免陽光直射。
  3. 如果必須進行手術，請務必告訴醫師正在服用本藥，並在手術前七天停止使用。
  4. 勿超過建議使用量。
  5. 服用本藥時請與開水一起服用。
  6. 一天服用三次，請於每天早上、中午、晚上，於飯前或飯後服用。
  7. 如果忘記服用或服用的劑量不夠時，請依照（用法用量）的指示方式繼續服用。
  8. 因個人體質不同，服用本藥後的療效反應可能有所差異。
  9. 使用本藥前，應先確認相關症狀不是因為其他潛在疾病之治療所引起。

**【用法用量】**

每次一錠，每日服用三次。

**【警語】**

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1. 使用本藥可能出現輕微的胃腸道不適（如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐），亦可能出現嚴重之不良反應。
  2. 器官出血（如眼睛、鼻子）、腦出血（如劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差）、胃腸道出血（如吐血、黑便、血便）。
  3. 過敏性皮膚反應（如紅斑、皮疹、水腫、搔癢）。
  4. 若有上述外之其他不適情況產生。
  5. 自覺狀況沒有改善或惡化。

**【包裝】**

6~1000錠PTP鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

**【保存上之注意】**

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 室溫25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

**【類別】**

醫師藥師藥劑指示藥品。

**【患者資訊】**

1. 請務必遵照（用法用量）的指示方法服用，否則可能無法達到預期的療效，如有必要，請由醫師指示其他的用法用量。
2. 服用本藥品時請不要咬碎，並與開水一起服用。
3. 一天服用三次，請於每天早上、中午和晚上，於飯前或飯後服用。
4. 如果忘記服用或服用的劑量不夠時，請依照（用法用量）的指示方法繼續服用。
5. 如果患者必須手術，請務必告訴醫師正在服用本藥品，並在手術前七天停止使用。
6. 月經期間請停止服用本藥品。

委託者：永甲興業股份有限公司  
Angel Associates (Taiwan), Inc.  
台北市松山區民權東路3段181號12樓

製造廠：永信藥品工業股份有限公司 台中幼獅廠  
YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.  
台中市大甲區日南里工九路27號  
服務電話：04-26875100

