



“力英” 力結核膜衣錠 500公絲
Anti-Tube F.C. Tablets 500 mg "L.E." 94. 1. 13

衛署藥製字第046702號
G-8508

[成份] : Each F.C. Tablet contains:

Para-aminosalicylate Calcium..... 500 mg

[作用] : 1. 藥效藥理

1.1 抗菌作用 -- 人形結核菌之淨菌作用

1.2 協力作用 -- 本品和streptomycin及isoniazide併用在試管內使抗菌力、血中抗
菌力及耐性延遲等具有協力作用。

2. 體內動態學(參考) : 健康成人4gm經口投與後，約一小時後最高血中濃度達
90ug/ml，以後0.91小時半衰期減少，24小時後約98%由尿中排泄，其中約57%
為Acetyl化體。

[適應症] : 肺結核及其他之結核症

[用法用量] : 1日10~15 gm，2~3回分次服用(增減)，希望和其他之抗結核藥併用。本藥須由醫師
處方使用。

[注意事項] :

1. 禁忌:高鈣血症之患者。

2. 慎重投與:

(a) 肝障礙，腎障礙及血液障礙之患者。

(b) 藥物過敏症之患者。

3. 副作用 -- 若有下列症狀出現應小心觀察，若認為異常時應停藥。

(a) 肝腎障礙。

(b) 白血球減少症，無顆球症，血小板減少症，溶血性貧血等。

(c) 甲狀腺機能障礙及甲狀腺腫。

(d) 若有發熱或皮膚過敏症狀出現時應停藥。

(e) 食欲不振，噁心，胃部不快感，下痢等。

4. 孕婦之投與 -- 孕婦給藥之安全性尚未確立。

5. 相互作用 : 同時服用口服抗凝血劑時抗凝血劑之劑量須小心調整。使phenytoin的
血中濃度上升

[儲存] : 室溫25°C以下阻光防濕保存。

[包裝] : 40~1000錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。

Code No: APT500

委託製造者: 力英藥品股份有限公司

台中市福安七街20號

製造廠: 培力藥品工業股份有限公司

台中市工業區六路十一號

TEL:(04)23592576(代表號)