



緒得克[®]糖衣錠

Moodytec[®] S.C. Tablets

【成份】

Each S.C. tablet contains:
Flupentixol (as Dihydrochloride) 3.00mg

【賦形劑】

Lactose、Avicel、Povidone K-30、Magnesium Stearate、Sugar、Gelatin、Acacia、Calcium Phosphate Dibasic、Wax、Talc、Tartrazine、Brilliant Blue FCF、Sodium Starch Glycolate、New Coccine、Shellac、Titanium Dioxide、Blue No 1 Aluminum Lake

【臨床藥理】

Flupentixol為Thioxanthene類之強效、無鎮靜作用之抗精神病藥，能迅速改善精神病症狀，也能改善焦慮，使精神較活潑。後項療效使本藥適合於退縮、情緒淡漠、缺少精力或合併憂鬱症狀的病人，或容易因具強鎮靜作用而顯得疲倦或思睡的病人。

【適應症】

精神病狀態。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

- 1.精神分裂症及類似精神病：
每天3-15mg，分2至3次給藥，需要時可提高到每天30mg。
- 2.妄想症：
初劑量每天二次，每次0.5mg，然後繼續增加劑量至每天2-3次，每次1 mg。維持劑量：每天1-1.5mg。
- 3.智能不足及癲癇合併精神病：
初劑量每天1-2mg，然後依病人之反應酌量增減，每日最高劑量為4mg。

【注意事項】

- 1.癱瘓疾病、嚴重肝腎及心血管疾病應審慎投予。
- 2.本藥可能影響駕駛及操作機器。
- 3.極度激動病人，急性巴比妥酸鹽、酒精和鴉片中毒的病人應禁用，孕婦禁止使用本藥。
- 4.過量時，針對所出現之症狀做必要的治療。維持呼吸暢通及血壓正常，但不可用Epinephrine。

【警語】

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

【交互作用】

- 1.Flupentixol會加強酒精、巴比妥鹽及其他中樞神經抑制劑之作用。
Flupentixol與Phenobarbital及Carbamazepine併用時之血中濃度會降低。
- 2.與鋰鹽併用會加強神經毒性。

【副作用】

- 1.中樞神經系統:錐體外症狀可能於治療初期產生，可藉降低劑量及抗巴金森氏症藥物的投與來改善，其他偶有失眠、無力、過動、激動等現象。
- 2.自主神經系統:口乾、視力模糊、便秘、唾液增加。
- 3.內分泌系統和代謝:體重改變、女樣化男乳、陽萎、月經週期改變，乳漏。
- 4.過敏中毒:高膽紅素血症、黃疸、全身性紅斑狼瘡、溶血性尿毒症。
- 5.皮膚:紅斑、紅疹、禿髮。

【儲存條件】

25°C以下儲存。

【包裝】

2-1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。