

莫氏

佳您乳膏 Morebeauty Cream "H.S."

本藥是經由皮膚直接吸收的維生素乳膏，含有維生素 A、D、E 成分，可以控制乾燥或龜裂的皮膚，使粗糙之肌膚保持濕潤光滑，並且促進肌膚的新陳代謝，恢復肌膚的柔軟性。

【成分】

有效成分及含量：each gm contains：

Vitamin A (as Palmitate)..... 2000I. U.

Vitamin D₃..... 500I. U.

DL- α -Tocopherol Acetate..... 2.0mg

其他成分(賦形劑)：Urea(尿素)、Aloe Vera Gel(蘆薈凝膠)、Cetyl Alcohol、Paraffin Liquid、Cream Base Wax、Nikkol、Methyl Paraben、Isopropyl Myristate、Glyceryl Monostearate、Bouquet、Purified Water。

【用途(適應症)】皮膚粗糙、龜裂性。防止皮膚乾燥、保護皮膚、防止凍裂傷、凍傷、凍瘡、日晒後之發熱。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用

(一)曾因本藥成分引起過敏。

二、有下列情形者，請洽醫師診治

(一)有深部皮膚組織感染。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

(一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)兒童需於監護者的指導與監督下使用。

(三)避免陽光直射。

(四)勿超過建議使用量或使用次數。

(五)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

(六)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

(七)本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。

(八)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

(九)本藥物使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

(十)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

(十一)患部有下列狀況者，建議不要使用。

1. 有傷口或紅腫。

2. 傷口流膿或潰瘍。

(十二)本藥不是化妝品，不可用於臉部基礎化粧。

【用法用量】

淋浴後，洗臉後，睡前適量充分塗擦手足、肘部、腳跟等角質化部份，化妝前修容、粉底用。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢、刺激感。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

(一)若有上述外之其他不適情況產生。

(二)連續使用7天後狀況未改善或更惡化。

【儲存】 儲存於 25°C 以下。

【包裝】 1000 公克以下塑膠瓶裝。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。