“強生”止眩錠 12公絲

MESLON TABLETS 12mg "JOHNSON"

衛署藥製字第046978號

【成　　分】每錠含有：

Betahistine mesilate.....12mg

【賦 形 劑】Aerosil 200、Avicel 101、Corn Starch、Croscarmellose Sodium、Hydroxypropyl Cellulose L、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate、Tartrazine Aluminum Lake

【藥效藥理】一、改善內耳之循環障害——對天竺鼠之實驗性內耳微小循環障害，將本藥投與腹腔內，30分後，與對照群比較，有148%之血流增加，這個現象，特別在發病的狀態時具有特異性。

二、消除內淋巴水腫——麻醉犬之胸管淋巴流量，經本藥靜脈內投與後，顯示有暫時性2～3.5倍之增加，這可解釋為水腫液，當為淋巴液被排出。另外，天竺鼠之內耳血流動態檢討結果，有內耳壓之Static level之下降及脈波之振幅增大現象，這可解釋為因本藥投與，使內耳血流增加，以及因而所伴有之內耳液之分泌及吸收之促進所致。

三、改善腦內血流量——麻醉犬之實驗，因本藥靜脈內投與，致內頸動脈之血流量有50%以上之增加，這個作用，不會因先投與抗組織胺劑而有對抗，反而有增強之趨向。

Betahistine mesilate對微小循環系，特別是內耳毛細血管括約肌具有弛緩作用，除能增加內耳血管系之血流之外，因能調整內耳毛細血管之透過性，而除去內淋巴水腫。又因能增加內頸動脈之血流量，也改善腦循環，因此可消除眩暈、眩暈感。

【適　應　症】梅尼艾氏症候群所引起之眩暈、聽力障礙。

【用法・用量】通常成人一次½～1錠，1日3次，飯後服用。

本藥須由醫師處方使用。

【注 意 事 項】一、下列患者須慎重投與

(一)曾患有消化性潰瘍之患者及活動性消化性潰瘍之患者。

(二)支氣管氣喘之患者。

(三)有褐色細胞腫之患者。

二、副作用

(一)消化系統：很少有噁心及嘔吐之出現。

(二)過敏症：很少有發疹等過敏症狀之出現。

(三)其他：有頭痛等症狀之出現。

三、對孕婦之投與——有關懷孕中投與時之安全性仍無確定，因此有可能懷孕或懷孕之婦女，如治療上判斷為有益性較高於危險性時才可投與。

四、本劑應置於小孩伸手不及處。

【包　　裝】3～1,000錠 塑膠瓶裝。本藥應儲存於15～30℃緊密容器，避光貯存。

Code No.:E-16

強生化學製藥廠股份有限公司
JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.
新北市241三重區三和路四段77、79號
訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579
工廠電話：(02)22878405