衛署藥製字第047087號
Code No. 31234 G-8623

使皮安 軟膏

Superan Ointment

【作用】
本品由三種抗生素混和製成的局部治療劑。
Neomycin ： 本成份具有有效之殺菌作用，對G(+)、G(-)菌引起之感染有效。
Polymyxin B ： 本成份對綠膿菌、大腸菌等G(-)菌有優異的抗菌作用。
Bacitracin ： 本成份對一般G(+)、G(-)菌具有抗菌力。

【成分】每公克含:
有效成分及含量:
Neomycin (as Sulfate) ……3.5mg(potency)
Polymyxin B(as Sulfate)……5000.0U(potency)
Bacitracin (as Zinc)……400.0U(potency)
【其他成分(賦形劑)】：Liquid Petrolatum、Isopropyl Myristate、White Petrolatum

【用途(適應症)及作用】
緊急處理、預防因皮膚外傷(如刀傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨傷、輕微燙傷)造成的感染或減緩傷口的感染。

【使用上注意事項】
一、有下列情形者，請勿使用：
（一）曾因本藥成分引起過敏。
二、有下列情形者，請洽醫師診治：
（一）3歲以下。
（二）有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
（一）兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
四、其他使用上注意事項
（一）為防止兒童誤食請妥善保管。
（二）避免陽光直射。
（三）勿超過建議使用量或使用次數。
（四）使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
（五）使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
（六）本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
（七）請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
（八）本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
（九）使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
（十）請勿使用超過7天以上。

【用法用量】
每日1-3次，局部清潔後，適量均勻塗抹(撒佈或噴灑)於患部，需要時得以滅菌紗布或繃帶覆蓋。

【警語】
一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	過敏性皮膚炎、繼發性感染。
耳朵	耳毒性
腎臟	腎毒性

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
（一）若有上述外之其他不適情況產生。
（二）使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】100公克以下鋁軟管裝、積層管裝。
【貯存】儲存25度C以下。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

委託者: 仲發實業有限公司
新北市中和區中正路782號6樓
製造廠: Made in Taiwan
溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號

9.8x15cm