

藥理作用

Betahistin 的作用機制未知，於動物的藥理試驗顯示可能是藉著鬆弛內耳之微小循環中的毛細管前括約肌，以改善內耳迷路中血管層的血液循環，藥理學研究發現 Betahistin 在中樞神經系統及自主神經系統有微弱的 H1 接受器刺激作用，及相當大的 H3 抗拮性質，也發現 Betahistin 對前庭神經叢側邊及中間神經核的神經細胞產生的神經衝動有抑制作用，且與劑量有關，這些觀察對治療梅尼爾氏症或前庭性暈眩是重要的，但機轉尚不明瞭。

成份

Each tablet contains : Betahistin dihydrochloride.....24mg

賦形劑

citric acid anhydrous, colloidal anhydrous silica, crospovidone, magnesium stearate, mannitol, microcrystalline cellulose, talc.

適應症

梅尼爾氏症候群所引起之暈眩、聽力障礙。前庭性暈眩的症狀治療。

用法用量 本藥須由醫師處方使用

成人的劑量為每天 2 次，每次 1 錠。可依個別用藥後的反應調整劑量。有時只經過幾個星期後的治療，觀察到改善，治療幾個月後可以獲得最好的效果。於疾病發作初期，及早使用本品加以治療，可避免病情繼續惡化或在疾病末期使用本品，防止聽力喪失。

禁忌症

對本品中成分過敏者禁用。

警告及注意事項

有嗜鉻細胞瘤(phaeochromocytoma)或氣喘的患者應謹慎使用，有消化性潰瘍史的患者應小心使用本品。

交互作用

無已知之交互作用。

孕婦、授乳婦之投與

以動物測試時，沒有不良的作用，沒有足夠的資料可以評估當懷孕時服用本品可能產生的不良作用。孕婦及哺乳婦仍不宜使用。

對駕駛或操作機械之影響

研究顯示 Betahistin 不會影響駕駛的能力及機械作用。

副作用

曾觀察到某些輕微胃炎之不適。通常與食物併服或降低劑量便能消除。極少數皮膚反應被報告，特別是皮疹、癢疹及蕁麻疹。

過量

有少數過量(高達 728mg)的病例，有輕到中度的症狀被報告，於 728mg 的劑量時，曾報告有抽筋(convulsion)的症狀。所有的病人都完全復原。過量的治療應包括標準支持療法。

包裝

4-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

儲存

儲存於 25°C 以下乾燥場所。疑過期後，請不要使用並丟棄。請放置於孩童無法取得的地方。

委託者：泰和碩藥品科技股份有限公司

地 址：臺北市南京東路二段206號7樓

製造廠：歐帕生技醫藥股份有限公司

地 址：新竹縣湖口鄉光復路1號