

# “強生” 牧舒爾顆粒 20毫克/公克

## ACET GRANULES 20mg/gm “JOHNSON”

衛署藥製字第 047237 號(GMP G-8688)

### 【成分】

有效成分及含量：每公克含 **Acetylcysteine 20mg**

其他成分(賦形劑)：Aspartame、Dextrose Anhydrous、Malic Acid、Orange Powder、Sunset Yellow FCF、Aluminum Lake

【用途(適應症)】 減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性。

### 【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 本品含阿斯巴甜 (Aspartame) 賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
2. 3 歲以下。
3. 支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 65 歲以上。
3. 正在服用抗生素類藥品(如 tetracyclines、doxycyclin、erythromycin、thiamphenicol)。

四、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 不得與酒精性飲料併用。
5. 本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

### 【用法用量】

年齡	劑量
成人及 12 歲以上	一天 3 次，每次 2 包或 10 匙(10 公克)
6 歲以上未滿 12 歲	一天 3 次，每次 1 包或 5 匙(5 公克)
3 歲以上未滿 6 歲	一天 3 次，每次 1/2 包或 2.5 匙(2.5 公克)
3 歲以下	請洽醫師診治

### 【警語】

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。
3. 消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。
4. 偶有發疹等過敏症狀。
5. 其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症狀發生。

【包裝】 5 公克/鋁箔袋裝，12-200 袋盒裝，60-1000 公克塑膠瓶裝。

【儲存條件】 25°C 以下避光乾燥處所貯存。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。

Code No. : D-32

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市 241 三重區三和路四段 77、79 號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405