Size:150x98mm

衛署藥製字第 047398 號
G- 8755 Code No.31312

"溫士頓"

視必康點眼液

"Winston"

Subican

Ophthalmic Solution

1. 於滴後約20-25分鐘，即可達到最大之散瞳及睫狀肌麻痺作用，可保持效果約15分鐘，如欲維持睫狀肌麻痺作用時，於20-30分鐘後，可再滴一滴。
2. 恢復快，可使患者很快離開醫師診室，於2-4小時內，可恢復眼之調節功能，通常於6小時內可完全恢復，無需藉助縮瞳劑，如應用縮瞳劑時，則恢復更快。
3. 本品不論虹膜之顏色如何都有效。
4. 本品為散瞳作用（具有適度短效睫狀肌麻痺作用）。

【成分】

Each ml contains:
Tropicamide.....5mg

賦形劑：Boric Acid、Edetate Disodium、Sodium Chloride、IN Hydrochloric Acid、Sodium Hydroxide GR、Water For Injection

【適應症】

散瞳及睫狀肌麻痺。

【用法用量】

用於檢查眼底--於檢查前15-20分鐘，將本品滴入一滴或二滴即可。
本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1. 勿用於房角狹窄性青光眼（narrow angle glaucoma）。
2. 與任何其他之散瞳劑同，當眼壓增高或眼壓不明或眼內前房淺時用時宜注意。於驗光（屈光），需要睫狀肌麻醉作用延長時，只需要另外附加一滴即可。
3. 本品瓶蓋打開使用後，瓶蓋宜蓋緊，並請於一個月內使用，超過一個月後請丟棄。
4. 須置於小孩接觸不到之處。

【副作用】

有時可能發生暫時性刺痛感覺。

【包裝貯存】

100 ml以下，塑膠瓶裝。
存於室溫（25℃）中保存，不要放於冰箱或高溫度環境中。

1406-01

Made in Taiwan

溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號