【8mg】衛署藥製字第 047346 號 G-8740
【16mg】衛署藥製字第 047512 號 G-8822

眩停® 錠 $^{8}_{16}$ 毫克

Dizynil® Tablet $^{8}_{16}$ mg

【藥理作用】

Betahistine 的作用機轉未知，於動物的藥理試驗顯示可能是藉著鬆弛內耳之微小循環中的毛細管括約肌，以改善內耳迷路中血管層的血液循環。藥理學研究發現 Betahistine 在中樞神經系統及自主神經系統有微弱的 H1 接受器刺激作用及相當大的 H3 拮抗性質，也發現 Betahistine 對前庭神經叢側邊及中間的神經產生的神經衝動有抑制作用，且與劑量有關。這些觀察對治療梅尼爾氏症或前庭性暈眩是重要的，但機轉尚不明瞭。

【藥 動 學】(依文獻記載)

Betahistine 口服後完全吸收，已知有一代謝物 2-pyridylacetic acid，由尿液排除。

【成　　份】

眩停錠8毫克　Each tablet contains：
Betahistine dihydrochloride ····· 8 mg

眩停錠16毫克　Each tablet contains：
Betahistine dihydrochloride ····· 16 mg

【賦 形 劑】

眩停錠8毫克　Aerosil Light、Mannitol、HPC-L、Avicel、Primojel、Magnesium Stearate、Talc

眩停錠16毫克　Aerosil Light、Mannitol、Hydroxypropyl Cellulose L、Avicel、Primojel、Magnesium Stearate、Talc

【適 應 症】

梅尼爾氏症候群所引起之眩暈、聽力障礙。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。
成人劑量為一天 24~48mg，分次使用。
可依用藥後的反應調整劑量。經過幾星期的治療後，有時僅觀察到改善。治療幾個月後可以獲得最好的效果。於疾病發作初期，及早使用本品加以治療，可避免病情繼續惡化或在疾病末期使用本品，防止聽力喪失。

【禁 忌 症】

曾對本藥成分過敏者禁用之。

【注意事項】

1. **有嗜鉻細胞瘤或氣喘的病人宜謹慎使用，有消化性潰瘍病史的患者亦須謹慎使用。**
2. **在動物試驗中，投予 Betahistine 沒有致畸型胎的副作用；但是孕婦與哺乳婦仍不宜使用。**

【不良反應】

一般患者對於 Betahistine 皆有良好的耐藥性。

曾經有輕微胃炎現象之報告，但通常於減少劑量或與食物併服之後，即可消除此現象；亦曾經有發生皮疹之報告。

【交互作用】

無已知的交互作用

【對駕駛或操作機械之影響】

Betahistine 不會影響駕駛或操作機械之能力。

【過　　量】

有少數過量(高達 640mg)病例報告，其中之一為噁心現象。

【貯存條件】

25℃以下儲存於乾燥場所。

【包　　裝】

眩停錠8毫克　　6-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

眩停錠16毫克　　6-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號