

"近江兄弟"

歐米威 眼藥水

OMI V Eye Lotion "Omi-Brotherhood"

特徵：

眼睛不斷地做著精巧的工作，因此眼組織細胞的物質代謝必須能時常圓滑進行。L-Aspartate 酸，即有促使眼組織細胞代謝圓滑進行而消除眼睛疲勞、提高眼肌之調節力，使能發揮正常的機能。

本劑即採用 L-Aspartate 酸為主劑並配有 Panthenol、dl-Chlorpheniramine Maleate 等具有保護眼睛健康的成分。眼睛若缺乏 Panthenol 眼睛就容易疲勞，故使用本劑將可緩解眼睛疲勞，使眼睛趨於舒適。

成分：Each ml contains :

Panthenol 1.0mg
Ephedrine Hydrochloride 1.0mg
L-Potassium and Magnesium Aspartate 15.0mg
dl-Chlorpheniramine Maleate 0.3mg
Chlorobutanol、Boric Acid、*I*-Menthol、Borneol、Distilled Water.

適應症：

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅、眼睛癢、眼睛疲勞。

用法用量：

一天 3~6 次，每次 1 至 2 滴。醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。(25°C 以下)
3. 使用前，請洗淨雙手。
4. 請依照藥品標示使用。
5. 過期眼藥水，請勿使用。瓶裝之眼藥水，開瓶 30 天後請勿繼續使用。
6. 藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
7. 為避免污染藥品，使用時請勿碰觸藥瓶瓶口。
8. 使用兩種眼藥水時，請隔開至少 5 分鐘後點藥。
9. 使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏；並請隔開至少 10 分鐘後點藥。

警語：

- 1、以下情況應停藥並立即就醫：
(1)連續使用三天(或 72 小時)症狀未解除。
(2)使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
(3)發生過敏反應。
(4)青光眼(Glaucoma)患者。
- 2、對本藥之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。
- 3、正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。
- 4、過度使用血管收縮劑會增加眼睛紅腫。
- 5、青光眼患者，除非經醫師指示，否則不要使用含血管收縮成分之製劑。

衛署藥製字第 GMP G-8847 號

047554

包裝：100 毫升以下塑膠瓶裝

儲存溫度：25°C 以下



近江兄弟
メントー・ム

日商：株式会社 近江兄弟社
商標授權



PIC/S GMP 優良藥廠
人生製藥股份有限公司
台灣台中市工業區五路3號
JEN SHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
TAICHUNG TAIWAN