


“近江兄弟”

歐米威 眼藥水

OMI V Eye Lotion "Omi-Brotherhood"



特 徵：

眼睛不斷地做著精巧的工作，因此眼組織細胞的物質代謝必須能時常圓滑進行。

L-Aspartate酸，即有促使眼組織細胞代謝圓滑進行而消除眼睛疲勞，提高眼肌之調節力，使能發揮正常的機能。

本劑即採用L-Aspartate酸為主劑並配有Panthenol、dl-Chlorpheniramine Maleate等具有保護眼睛健康的成分。眼睛若缺乏Panthenol眼睛就容易疲勞，故使用本劑將可緩解眼睛疲勞，使眼睛趨於舒適。

【成分】

有效成分及含量

Each mL contains:

Panthenol.....1.0mg
Ephedrine Hydrochloride.....1.0mg
L-Potassium and Magnesium Aspartate.....15.0mg
dl-Chlorpheniramine Maleate.....0.3mg

其他成分(賦形劑)：Chlorobutanol、Boric Acid、L-Menthol、Borneol、Purified Water。

【用途(適應症)】：暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅、眼睛癢、眼睛疲勞。

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一)正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
 - (二)青光眼的人。
- 三、其他使用上注意事項：
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)使用前，請洗淨雙手。
 - (四)請依照藥品標示使用。
 - (五)以下情形，請勿繼續使用。
 1. 超過保存期限的眼藥水。
 2. 開瓶28天後。
 3. 藥液混濁、變色或出現異物時。
 - (六)為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
 - (七)如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 1. 使用眼藥水及眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。
 2. 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。
 - (八)配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。
 - (九)過度使用會增加眼睛紅腫。

【用法用量】：一天3~6次，每次1至2滴。

【警語】：

- 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫生診治：
- (一)連續使用三天症狀沒有改善。
 - (二)使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (三)若有任何不適情況產生。

【包裝】：100毫升以下塑膠瓶裝。

【儲存條件】：儲存於25°C以下。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字047554號

委託者：人生製藥股份有限公司

台灣台中市工業區五路3號

製造廠：台灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區為隨里為隨東路50號



近江兄弟
メンターム®
日商：株式會社 近江兄弟社
商標授權



PIC/S GMP優良藥廠
人生製藥股份有限公司
台灣台中市工業區五路3號
JEN SHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
TAICHUNG TAIWAN

“近江兄弟”

歐米威 眼藥水
OMI V Eye Lotion
"Omi-Brotherhood"



近江兄弟
メンターム®
日商株式會社 近江兄弟社
商標授權

有效成分及含量 Each mL contains:

Panthenol.....1.0mg
Ephedrine Hydrochloride.....1.0mg
L-Potassium and Magnesium Aspartate.....15.0mg
dl-Chlorpheniramine Maleate.....0.3mg

用途(適應症)：暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、或眼睛紅、眼睛癢、眼睛疲勞。

用法用量及注意事項：請詳閱說明書後使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

委託者：人生製藥股份有限公司

台灣台中市工業區五路3號

製造廠：台灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區為隨里為隨東路50號

衛署藥製字 047554號

製造批號：

製造日期：

保存期限：