

Pipemi Capsules 400mg “Patron”

Quinolone 類藥品可能與肢體障礙及潛在不可逆嚴重不良反應之發生相關，包括肌腱炎、肌腱斷裂、周邊神經炎及中樞神經系統作用。

本劑對綠膿菌，大腸菌，變形桿菌，克雷白氏桿菌等革蘭氏陰性菌具有強力的抗菌作用，阻礙細菌元 DNA 合成，而達殺菌作用。其與抗生素之間不具交叉耐性，對抗生物質已產生耐性之細菌，本品仍具有抗菌作用，口服即具有很高的療效，易被消化器官吸收，而廣佈於腦、脊髓以外的器官及組織中，尤其以移行於肝臟、消化道、腎臟、膀胱之濃度較高，它不在體內代謝，主要經由尿中排泄，口服後 1 小時血漿濃度可達最高值，尿中濃度則於 2~4 小時後達最高值，24 小時後尿中累積回收率達 88%，毒性低，對於臨床上特別難治之尿路感染症及中耳炎，具有很高的療效。

【成分】：每膠囊含：

Pipemidic acid trihydrate-----471.3mg
(eq to Pipemidic acid-----400.0mg)

【賦形劑】：Primojel, Magnesium stearate.

膠囊：Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Purified Water, Titanium Dioxide.

【適應症】：治療由綠膿桿菌、大腸菌、變形桿菌、克雷白氏桿菌、腸內桿菌、枸橼桿菌、赤痢菌、腸炎弧菌所引起的腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎、中耳炎、細菌性赤痢、腸炎、副鼻腔炎。

【用法用量】：

通常成人一天二次，一次一粒，早晚服用。

【類別】：本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

1. 有嚴重障礙之患者應慎重使用。

2. 副作用：

(1) 若有發疹、蕁麻疹、搔癢感、發熱的現象應中止使用。

(2) 對腎臟有時會 BUN，血中 creatinine 上升。

(3) 對肝臟有時會使 SGPT 上升。

(4) 對胃腸方面會有食慾不振、噁心、嘔吐胃部不快感、膨脹感、胃痛、下痢、便秘等症狀。

(5) 其他，有時會有白血球減少、頭痛、頭重倦怠、眩暈、口渴、口內炎發生，會有慢性腎不全而使骨髓液內濃度升高、痙攣發生之病例。

3. 對臨床檢查尿蛋白之測定法有時會呈現測定值升高 (Fals high value of urine protein) 因此請用煮沸法及試紙試驗法測定。

4. 對小孩安全性尚未確定，故應避免使用。

5. 孕婦、授乳婦安全性尚未確立故應避免使用。

6. 其他：用於幼犬實驗會有關節異常發生之例。服用類似化合物類 (Piromidic acid) 曾有腎障礙的病例報告。

【警語】：

1. 過去使用 quinolone 或 fluoroquinolone 類藥品曾發

生嚴重不良反應的病人，應避免使用本藥。

2. 肌腱炎及肌腱斷裂

肌腱炎及肌腱斷裂(好發於阿基里斯腱)，有時為雙側，可能在開始使用 quinolone 類藥品的 48 小時內很快發生，也可能甚至在停藥數個月後才發生。老年人、腎功能不良、曾進行器官移植或同時併用皮質類固醇的病人會增加肌腱炎及肌腱斷裂的風險，故使用本藥應避免併用皮質類固醇。當出現肌腱炎的初期徵兆(如疼痛腫脹、發炎)，應停用本藥並考慮使用替代藥物。受到影響的肢體應加以適當的治療(如加以固定)。倘出現肌腱病變的徵兆應避免使用皮質類固醇。

3. 中樞神經系統作用：

(1) 精神相關不良反應

Quinolone 類藥品可能增加精神相關不良反應，包括中毒性精神病、精神病反應進展至自殺意念/想法、幻覺或妄想；憂鬱或自殘行為如企圖自殺或完成自殺；焦慮、躁動或緊張；精神混亂、瞻妄、失去方向感或注意力無法集中；失眠或做惡夢；記憶力受損。這些反應可能發生在第一次投藥後。建議使用本藥之病人倘出現前述不良反應，應立即告知醫療人員，停用此藥並開始適當的治療。

(2) 中樞神經系統不良反應

Quinolone 類藥品可能增加與癲癇(痙攣)風險、增加顱內壓(假性腦腫瘤)、頭暈和顫抖有關。此類藥物已知會誘發癲癇或降低癲癇閾值。曾有癲癇重積狀態的通報案例。應小心使用於癲癇病人及已知或疑似患者有可能會誘發癲癇或降低癲癇閾值之中樞神經疾病(如嚴重腦動脈硬化、有痙攣病史、腦部血流減少、腦部結構改變或中風)，或具其他可能會誘發癲癇或降低癲癇閾值危險因子(如藥物、腎功能不全)的病人。如發生癲癇應停用本藥並開始適當的治療。

4. 血糖異常

Quinolone 類藥品可能與血糖異常有關，包括有症狀的高血糖和低血糖，通常發生於同時使用口服降血糖藥物(如 glyburide)或胰島素之糖尿病病人，建議針對這些病人要小心監控血糖值。

曾有嚴重低血糖導致昏迷或死亡的通報案例。如使用本藥之病人發生低血糖反應，應停用本藥並立即開始適當的治療。

【包裝】：

4~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【貯法】：25°C 以下儲存。

臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區為隨東路 50 號

TEL：(07)6216126