cGMP 藥品

“派頓” 嗽舒爽錠

衛署藥製字第 048040 G-9147 號

Cosorine Tablets “Patron”

鎮咳藥是抑咳嗽中樞或直接鬆弛氣管之肌肉，以達抑止咳嗽之目的。本劑含有 Codeine 具止咳作用係抑制咳嗽中樞及咳嗽反射以達抑制效果對無助益性的乾咳及頻咳相當有效另一成分 Papaverine 對平滑肌直接作用可緩解支氣管之痙攣，故對痙攣性咳嗽成效甚佳。

【主 成 份】：每錠中含有：

Codeine Phosphate----------6mg

Papaverine Hydrochloride----------30.0mg

Phenolphthalein----------30.0mg

【特　　點】：

1、Codeine phosphate：可抑制咳嗽反射，此外它對延髓(medalla)的咳嗽中樞亦有抑制作用即提高限閾(threshold)，對刺激性咳嗽具有抑制效果，此外 Codeine 亦具鎮靜、鎮痛作用。

2、Papaverine HCl：具中樞作用，對平滑肌具直接作用故可緩解肌肉異常緊張或肌肉痙攣並具血管擴張作用。

3、Codeine phosphate 之咳嗽中樞抑制作用與 Papaverine 氣管鬆弛作用同時發揮，可產生鎮咳作用，且同時可有支氣管之足夠的分泌而易於咯出濃痰。

4、Papaverine HCl 之平滑肌鎮痙作用與 Codeine phosphate 之中樞性鎮痛、鎮靜作用相配合，可迅速消除各種平滑肌痙攣所引起之劇痛，故可緩解因過度咳嗽引起之胸痛。

5、Phenolphthalein 之緩下作用可消除 Codeine phosphate 產生之便秘的副作用。

【適 應 症】：鎮咳(感冒、急慢性支氣管炎、咽頭炎、喉頭炎所引起之咳嗽)。

【用法用量】：通常成人一次 3 次，一次 1 錠，飯後服用。

【類　　別】：本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

1、新生兒、幼兒、老年人、肝障碍、嚴重呼吸抑制、支氣管氣喘青光眼患者及孕婦應謹慎使用。

2、本品與其他麻醉劑、鎮咳劑、phenothiazine 系化合物、三環系抗抑鬱劑、MAO 抑制劑併用時作用會加強，故併用時應小心謹慎。

3、若有皮膚發疹的情況發生時，請停止服用本品。

【警　　語】：長期使用易致成癮。

【包　　裝】：6～1000 粒塑膠瓶裝 、鋁箔盒裝。

【儲　　存】：於 25℃以下儲存。

臺灣派頓化學製藥股份有限公司
廠址:高雄縣岡山鎮爲隨東路 50 號
TEL：(07)6216126