【相互作用】

本藥與下列物質併用時須注意：

1.Phenothiazine 類、Barbiturate 等的中樞神經抑制劑，有增強其作用之慮，此等場合時希望不要投與，不得不投與時須慎重投與之。

2.攝取酒精患者，會增強中樞神經抑制作用，此等場合時希望不要投與，不得不投與時須慎重投與之。

【副作用】

1.依賴性：

(1)大量連續使用時亦少有依賴性產生，在大量投與或連續使用中，突然快速減量或中止投與，偶有譫妄、震顫、不眠、不安、幻覺、妄想等停藥症狀，故欲中止投與時須小心施行，慢慢減量。

(2)刺激、興奮、錯亂

投與精神分裂病的精神障礙患者反而有刺激興奮錯亂等之出現，須施行充份觀察，症狀顯現時應中止投與，施行適切之處置。

2.其他副作用

下列副作用出現時，必要時應施行減量或中止投與等適切之處置。

(1)精神神經系：

偶爾有目眩、頭暈、頭痛、焦躁感、震顫、發呆、起床不快感、視覺調節障礙、複量眩、譫妄、健忘、不眠、多夢、言語障礙等之出現。

(2)肝臟：

罕有血清 GOT、GPT 之上升、黃疸之出現。

(3)消化系：

偶而有口渴、食慾不振、噁心、嘔吐、腹部不快感、膨滿感、便秘、又罕有下痢、軟便、流涎增加、灼胸等之出現。

(4)過敏症：

偶爾有發疹出現，罕有搔癢顯現，症狀出現時，請即中止投與。

(5)骨骼肌肉：

偶爾有疲勞、倦怠、無力感、肌肉鬆弛。

(6)其他：

偶爾有性慾減退、排尿困難、又罕有新聲、喉塞感、舌尖的刺裂感、手麻感、發汗、微熱、腋窩之腫脹，尿失禁、月經前緊張、脫毛等之現象。

【包裝】

6~1000 錠 塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

製造廠:優生製藥廠股份有限公司

廠　址:台中市工業區 21 路 14 號