



# 敏易通<sup>®</sup> 錠

## Minieton<sup>®</sup> Tablets

Mequitazine 係由 phenothiazine group 衍生而得，具有抗組織胺之功能與作用。抗組織胺能競爭性阻斷身體各組織胺接受體對組織胺之效應，因而減弱或阻斷組織胺在身體產生之作用，但抗組織胺並不會刺激組織胺或阻止其合成或釋放，抗組織胺是用來治療各種過敏性症狀。

Mequitazine 經證實比 promethazine 產生較少之鎮靜作用。

### 【成份】

Each Tablet Contains:

Mequitazine .....5 mg

### 【賦形劑】

Povidone、Lactose、Primojel、Starch、Silicone Dioxide、Magnesium Stearate、Talc

### 【適應症】

乾草熱、過敏性鼻炎、蕁麻疹、濕疹、血管神經性水腫、季節性結膜炎、藥物過敏。

### 【用法用量】

本藥須由醫師處方使用

成人：每日二錠，早晚各一錠。

老年人：無特殊之用法用量資料，老年人使用本品宜小心。

孩童：十二歲以下孩童不建議使用。

本品具有較長時間之藥效，早晚服用各一錠即可控制症狀。

### 【禁忌】

1. 凡對於 phenothiazines 會產生過敏者，皆不宜投與。
2. Mequitazine 不可與 monoamine oxidase inhibitors 併用。
3. 罹患癲癇、前列腺肥大、青光眼與肝病者使用本品宜小心。
4. 孕婦不宜使用本品。

### 【警語】

1. 實驗證明 Mequitazine 不會影響病人的敏捷性、操作和反應能力。
2. 少數病患可能感覺昏昏欲睡，從事開車或具危險性的機械操作時，必需特別注意。
3. Mequitazine 可能會加強 sympathomimetic amines 的作

用。

4. 本品可能會加強酒精對少數病患的鎮靜作用。

**【副作用】**

抗膽鹼激素作用所引起的口乾與視力模糊等現象，在剛開始服用期間偶爾會發生。

**【藥物過量的治療】**

灌腸法及一般急救法，避免使用phenothiazine衍生物來作鎮靜治療法。

**【保存方法】**

請放置於 25°C 以下陰涼乾燥處儲存，避免日照。

**【包裝】**

4~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司  
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
新市廠：台南市新市區中山路182號