

"安星" 舒服寧 錠60毫克  
Sufolin Tablets 60 mg "Astar"

本劑是一種交感神經興奮劑，對 $\alpha$ 和 $\beta$ 感受體都有作用且對血管具有收縮作用，能使呼吸管黏膜腫脹消失。

【成 分】：每錠中含有：

Pseudoephedrine Hydrochloride.....60mg

【賦 形 劑】：Neusilin FH-1、Lactose、Corn Starch、Calcium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Hydroxypropylcellulose。

【適 應 症】：一般感冒或過敏所引起之鼻內充血及過敏性鼻炎、血管舒縮性鼻炎、支氣管氣喘。

【用法用量】：通常成人一次一粒，一天3~4次，小孩之量宜減。餘者可依患者之年齡、體重、症狀之差異而做適宜之增減。

本藥須由醫師處方使用

【注意事項】：(一) 一般的注意：(1) 擬正規用法、用量使用，仍舊無效時，停止投與；小兒投與時應指導正確的使用法，仔細的觀察經過情形。

(2) 使用過量有不整脈，甚至有心停之虞(尤以注射為最)。

(二) 慎重投與：甲狀腺機能亢進症、高血壓、心疾患、糖尿病、青光眼、前列腺肥大症。

(三) 副作用：(1). 循環器系：心悸亢進、血壓上升等症狀出現。

(2). 精神神經系：頭痛、頭重、振顫、不眠、眩暈、發汗、神經、過敏、脫力感等症狀。

(3). 尿尿器：排尿困難現象。

(4). 胃 腸：噁心、嘔吐、食慾不振等症狀出現。

(5). 過敏症：有發疹等過敏症狀出現時應停藥。

(6). 長期運用：不寧、幻覺、妄想的精神症狀出現時應停止投與。

(四) 相互作用：(1) MAO阻礙劑，甲狀腺製劑(如Liothyronine, Thyroxin等)，會增強本劑的作用，宜減量慎重使用。

(2) 與副腎素Isoproterenol等Catecholamine劑併用時，引起不整脈，甚而心跳停止，應禁止使用。

【包 裝】：6-1000錠鋁箔盒裝。  
【儲 藏】：25°C以下避光儲存。

安星製藥股份有限公司  
新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號