

舒膚美洗劑 0.1% w/w

Mome Lotion 0.1% w/w

僅供皮膚外用

衛署藥製字第 048214 號 G-9249

本藥須由醫師處方使用

主成分 本品每公克(g)含 1 毫克(mg)之 Mometasone furoate。

適應症 對類固醇具有感受性之皮膚病所引起之炎性反應及搔癢之緩解。

作用 Mometasone furoate 為一種合成的類固醇，具有抗發炎、止癢及血管收縮等特性。

用法用量 每日一次，以數滴 Mome lotion 塗抹於皮膚或頭皮患處，輕輕按摩，直到藥物消散。

副作用 使用 Mometasone furoate 洗劑極少發生的局部副作用，包括：灼熱感、毛囊炎、痤瘡反應、搔癢和皮膚萎縮症狀。使用其他外用類固醇製劑曾有少數有關下列局部副作用的報告：刺激性、多毛症、色素沈著不全 (hypopigmentation)、口周皮膚炎 (perioral dermatitis)、過敏性接觸皮膚炎、皮膚浸軟、二次感染、皺摺及汗疹。

禁忌症 禁用於對 Mometasone furoate 或其他類固醇，或製劑中任一成分過敏的病人。

注意事項 如有刺激或過敏發生，應停用本劑，並施予適當治療。如患處有感染發生，可併用抗生素和抗微生物劑，如果情況未見好轉，則應停用本劑，直至感染得到適當控制後方可使用。

全身性使用之類固醇易引起的副作用，如腎上腺抑制，偶爾也會發生在局部使用之類固醇，特別易發生於嬰幼兒。大面積、密閉式治療容易增加全身性吸收，所以在長期使用本劑時，尤其嬰幼兒，需特別小心。

兒童使用局部類固醇較成人病患更易導致下視丘腦下垂體軸功能抑制及 Cushing's syndrome，因為體表面積/體重的比例較大。兒童局部使用類固醇必須將劑量限制在可達有效治療的最低使用量，長期的類固醇治療可能會干擾兒童的生長發育。

本劑不可作為眼用。

懷孕或哺乳婦女 Mometasone furoate 洗劑對懷孕婦女的安全性尚未建立，因此只有在對母體的有益性大於對胎兒的危險性時，才可使用局部類固醇。此類的藥品不得大量或長期使用於懷孕婦女。局部使用類固醇，尚不知全身的吸收量是否會分泌在乳汁中到達可測的量，但全身性給藥的類固醇會分泌於乳汁之中，然而其分泌量不足以影響幼兒。在用藥前應先評估用藥對母親的重要性，再決定停止哺乳或停藥。

過量使用 症狀：過量長期使用會抑制下視丘-腦下垂體功能，引起腎上腺功能抑制。

治療方法：可給予適當的症狀療法。急性皮質類固醇過多為可逆反應。如有需要，可做適當處理來治療電解質不平衡。如果為慢性中毒，建議以漸進式中止類固醇治療。

包裝：4,000mL 以下塑膠瓶裝。

請保存於 25°C 以下。

製造廠：東洲化學製藥廠股份有限公司

廠址：台北縣蘆洲市中山二路 195 巷 12 號

委託者：齊山科技有限公司

地址：新竹市經國路二段 140 號

Tel: 02-66320988