衛署藥製字第048573號

"培力" 立環素膠囊
CYCLOCIN Capsules "P.L."

【成　　分】每顆膠囊含有：Cycloserine.....250 mg (potency)
【賦 形 劑】Lactose, Colloid Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate
膠囊殼：Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Purified Water, Brilliant Blue FCF, New Coccin, Titanium Dioxide, Sunset Yellow FCF, Tartrazine
【適 應 症】肺結核。
【用法用量】成人開始服用之前兩星期通常每12小時1粒，之後視情況增量但1天量不宜超過4粒。
本藥品亦可與其他抗結核藥併用。
本藥須由醫師處方使用。

【禁　　忌】
1.對本藥過敏者。
2.抑鬱、嚴重焦慮或精神障害患者。
3.嚴重腎疾患者。
4.同時飲用超量酒精。
【警　　語】服用本藥後如產生過敏性皮膚症，或中樞神經中毒症狀時應停止服用或減低劑量。
【注意事項】
1.患者一天服用劑量超過500mg時應密切觀察是否引起諸如痙攣等之中樞神經中毒。抗痙攣劑或安靜劑可能可以控制中樞神經中毒所引起之症狀。
2.服用本藥或其他抗結核劑偶而會引起維他命B12或葉酸之缺乏、貧血症。服藥中如證明產生貧血症應予以適當治療。
3.曾有報告如同時使用Ethionamide發生潛在性之神經中毒副作用。
4.本藥是否對胎兒有害或對產婦生產之影響資料仍未建立。懷孕婦女只在確實需要時才投與。
5.由於對哺乳嬰兒具潛在嚴重副作用，如需投與本藥時應停止哺乳。
6.本藥對小孩病患之安全性和有效性資料仍尚未建立。
【副 作 用】
1.神經系統症狀之副作用通常出現於每日服用超過500mg之高劑量。
2.過敏症狀。
3.胃腸障害。

【藥理作用】
1.口服Cycloserine後即快速由腸胃道吸收，並於4小時內達到血中尖峰濃度，正常之劑量250mg一天兩次通常可維持25～30ug/ml之血中濃度。
2.Cycloserine在血清中發現之濃度也可出現在腦脊髓液、胸膜腔液、胎血和母乳中。
3.約65%之單劑量Cycloserine在口服後72小時內可於尿液中回收，其餘約35%則被代謝到未知物質。
4.服用後最大排泄率在2～6小時，約50%之藥物於12小時內消失。
【儲　　存】本品具吸濕性必須密閉，室溫25℃以下保存。
【包　　裝】4--1000 粒塑膠瓶裝。
4--1000 粒鋁箔盒裝。

培力藥品工業股份有限公司
地址：407台中市西屯區工業區六路11號
電話：04-23592576(代表號)
傳真：04-23590992