μg/g(15分鐘後)，在眼瞼為6.55μg/mL(30分鐘後)，在眼球結膜為5.76μg/g(15分鐘後)，在前房水中稍少為0.68μg/mL(2小時後)，在虹彩、毛樣體中亦稍少為0.65μg/g(30分鐘後)，脈絡膜中亦稍少為0.26μg/g(15分鐘後)。血清中極少為0.020μg/mL(15分鐘後)。有角膜炎症之眼睛比正常眼睛呈現較高的移行濃度。

②0.3%[^{14}C]-Norfloxacin溶液在有色兔子正常之眼睛中每回一滴、一日五回點眼14天時，最後點眼24小時後的眼組織內濃度，在虹彩、毛樣體中為3.00μg · eq/g，在脈絡膜、網膜色素上皮中為3.65μg · eq/g，除了色素上皮外，網膜在測定範圍限界以下，而在含有黑素(Melanine)色素組織中，認定具高度之分布。

性狀：

1.製劑的性狀

本劑為無色～淡黃色澄明之水性點眼劑。

pH	浸透壓比
5.0～5.4	約1

(浸透壓比是對生理食鹽水之比率)

2.有效成份在物理化學上的知識：

一般名：Norfloxacin, r-INN

略號：NFLX

化學名：1-ethyl-6-fluoro-1, 4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid


分子式：$C_{16}H_{18}FN_3O_3$

分子量：319.34

融　點：220～224

性　狀：為白色～淡黃色的結晶性粉末，無臭、味苦。易溶於冰醋酸，稍難溶於二氯甲烷，難溶於丙酮與氯仿，極難溶於甲醇與乙醇，幾乎不溶於水。溶於0.1N鹽酸試液與氫氧化鈉試液。

化學構造：



儲存：25℃以下避光保存(請勿長時間以低溫保存)。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第048581號
G-9497號

包裝：100毫升以下塑膠瓶裝。

cGMP
Sinphar® 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0800)015151　website：http：//www.sinphar.com