綜 合 感 冒 劑

易 而 善 加 強 感 冒 液

EARSUN COLD SOLUTION

衛署藥製字第 048659 號

【成分】

有效成分及含量：每ml中含有下列成分：

Chlorpheniramine Maleate ----------0.12mg
Potassium Guaiacolsulfonate ----------3mg
Acetaminophen ----------12mg
dl-Methylephedrine Hydrochloride ----------0.48mg
Caffeine Anhydrous ----------1.5mg

其他成分(賦形劑)：Propylparaben、Sucrose、Caramel、Sodium Chloride、Monosodium Glutamate、Strawberry Essence、Ethanol。

【用途(適應症)】緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰、發燒、頭痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用:曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治:

1. 12歲以下
2. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
3. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
4. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
5. 有心臟病及65歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
3. 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
4. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項:

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
5. 不要服用本藥超過七日。
6. 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
7. 酒精警語:不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
8. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
9. 避免再服用含咖啡因藥品、飲料(如茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎損害，不可長期使用。

【用法用量】

成人及12歲以上	一日4次，每次8 ml，飯後半小時內服用為宜。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副 作 用
皮　　膚	發疹、發紅
胃 腸 道	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其　　他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
3. 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
4. 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
5. 服用過量〔每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)〕，或服藥後出現下列症狀:胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
6. 有過敏情形，例如:臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。【包裝】8~4000毫升玻璃瓶裝。【儲存條件】儲存於(25℃以下)玻璃瓶內。

商標授權商：大川藥品有限公司

藥商及製造廠：依必朗化學製藥股份有限公司　　地　址：彰化縣福興鄉福工路１１號