



三支雨傘



感冒膜衣錠

本品為綜合感冒製劑，可緩解感冒諸症狀！

感冒大都由病毒感染所引起，伴隨而來的惱人頭痛、發燒、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰、關節痛、咽喉痛、畏寒、肌肉酸痛等影響日常生活作息的不適症狀，如能及早服用綜合感冒製劑，可緩解相關症狀。

友露安感冒膜衣錠係本公司針對上呼吸道感染引起之感冒症狀，為一含解熱鎮痛、鎮咳祛痰、充血解除及抗組織胺劑等所組成之複方膜衣錠劑型。

【成分】每錠含有：

有效成分及含量：

Acetaminophen..... 325 mg  
 Potassium guaiacol sulfonate..... 80 mg  
 Chlorpheniramine maleate..... 2 mg  
 Noscaphine..... 15 mg  
 Phenylephrine hydrochloride..... 4 mg  
 Caffeine anhydrous..... 40 mg  
 其他成分(賦形劑)：Microcrystalline cellulose, Vanilla powder, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, HPMC615, Tartrazine aluminum lake

【用途(適應症)】緩解感冒之各種症狀(頭痛、發燒、流鼻水、鼻塞、畏寒、打噴嚏、咳嗽、喀痰、咽喉痛、關節痛、肌肉酸痛)。

【使用上注意事項】

1. 有下列情形者，請勿使用：
  - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
  - (2) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (1) 12歲以下。
  - (2) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
  - (3) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
  - (4) 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
  - (5) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (2) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
  - (3) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
  - (4) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
4. 其他使用上注意事項：
  - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (2) 避免陽光直射。
  - (3) 勿超過建議劑使用量。
  - (4) 不要服用本藥超過七日。
  - (5) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
  - (6) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
  - (7) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
  - (8) 不得與酒精性飲料併用。
  - (9) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

成人及12歲以上 一日3次，每次1錠。

### 【警語】

1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
- (1) 若有任何不適情況產生。
  - (2) 咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
  - (3) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
  - (4) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
  - (5) 服用過量〔每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg)〕，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
  - (6) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】6~1,000錠PTP鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

【貯存】貯存於25℃以下，陰涼乾燥處

【類別】醫師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第048791號 GMP G-9638

### 【藥效藥理作用】

#### Acetaminophen

是一種對胃無刺激性且有效的鎮痛、解熱劑，可經腸胃道快速吸收，口服後10~60分鐘達最高血漿濃度，具中樞性鎮痛解熱作用，能緩解感冒引起之發燒、頭痛、骨關節疼痛等。在症狀發作時就馬上服用，可有效治療偏頭痛的發作。

#### Chlorpheniramine maleate

本品為有效之抗組織胺，能有效緩解由感冒或過敏引起之鼻炎、流鼻水及上呼吸道炎伴隨之咳嗽或噴嚏等過敏性症狀。

#### Noscapine

為非麻醉類鎮咳藥，透過抑制延腦咳嗽中樞，來反制咳嗽反射，能有效舒緩惱人的咳嗽。具有解痙作用，對痙攣性咳嗽亦有效果，不會產生藥物耐受性及依賴性。

#### Potassium guaicol sulfonate

具祛痰作用，減少支氣管分泌痰液，並且降低呼吸道內濃痰的稠度，來舒解因痰液刺激而引起的咳嗽。

#### Phenylephrine hydrochloride

是一種鼻充血解除劑，具收縮鼻黏膜血管，抑制充血、腫脹功效。對於過敏或感冒引起的鼻塞、能促進鼻道暢通，恢復舒適呼吸。

製造廠：衛達化學製藥股份有限公司

地址：台中市工業區23路21號

委託者：大裕生技興業有限公司

地址：台中市西屯區府會園道179號19F